

Zeichenerklärung und Hinweise

- O für vollsonnige Lage
- volle Sonne auch in heißer und ausgesprochen trockener Lage liebend oder jedenfalls gut ertragend.
- für Standorte lichter Beschattung, d. h. entweder unter nicht zu tief beasteten, lockerstehenden und feinbelaubten Bäumen oder aber "hell", d. h. ohne Zweigüberhang, jedoch gleichzeitig ohne längere, direkte Sonnenbestrahlung, also im Seitenschatten höherer Bäume usw. Uberall dort, wo im Text noch zusätzlich der Begriff "absonnig" verwendet wird, gilt letzteres mit der besonderen Deutlichkeit, daß die betr. Arten überhaupt nichts mit Schatten im Sinne von "Wald" zu tun haben, sondern entweder entfernt von Bäumen eben im "Seitenschatten" oder aber am besten an hellen, jedoch nach Nordosten bis Nordwesten geneigten kleinen Hängen oder Mauern usw. stehen wollen, auf deren Flächen die Sonne nicht direkt auftrifft und die daher künl bleiben. Bei solchen Arten also meist auch Vorsicht mit herbstlichem Fallaub auf den Pflanzen! Diese ganzen Zusammenhänge sind wohl zu beachten. Es gibt natürlich verschiedene Überschneidungen, die in einem Katalog nicht genau erläutert werden können.
- auch tieferen Schatten unter dichtlaubigen Bäumen ertragend.
- nicht austrocknende, frische bis feuchte Böden liebend, je nach zugefügten Lichtzeichen in Sonne oder Schatten. In gewissen Fällen ist das Feuchtigkeitsbedürfnis in der Sonne austauschbar gegen leichte Beschattung. So gedelnt etwa Trollius, ursprünglich eine Pflanze sonniger, aber rel. feuchter Bergwiesen, auf trockenen leichten Böden besser in licht-absonniger Lage.
- Verbindungen mehrerer Lichtzeichen deuten biologische Spannweiten der betreff. Arten an, also z. B. Halbschatten liebend, aber in normaler Lage bei ausreichender Feuchtigkeit auch noch volle Sonne vertragend, oder aber Kombinationen z. B., derart, daß die Pflanze auf trockenen Böden und in warmer Lage ohne Schaden auch in lichten Gehölzschatten hineingeht. Bei letzterem handelt es sich um eine besondere Spielart des Schattentypus, welcher etwa mit dem Begriff "lichter Trockenwald" anschaulich gemacht wäre. Sie bezieht sich vorwiegend auf Gegenden geringer Luftfeuchtigkeit. Im kontinentalen Osten stehen z. B. Wachholder und Heide gerne unter Baumschirm, und auch die gewöhnlichen Arten sonniger Blößen, wie Glockenblume, Johanniskraut, Skabiosen und andere ziehen sich oft tief in die lichten, warmen Mischwälder hinein. In vielen Fällen entziehen sich die Standortsvarianten im Sinne solcher wechselnder Kombinationen der "Zeichensprache", wenn man nämlich nicht nähere Erläuterungen geben kann. Deshalb können oben angedeutete Verbindungen die Möglichkeiten nicht erschöpfen, aber sie sollen zu lebendiger Vorstellung anregen. Die Haupteigenschaft, von welcher man auszugehen hat, steht grundsätzlich voran.
- Ziffern geben die Blütenmonate an, soweit diese nicht in Worten ausgeschrieben sind, also z. B. 3 = März, 4 = April usw.
 - T Pflanzen werden des besseren Anwachsens halber mit Topfballen geliefert. Durch die Sicherheit liegt der Vorteil auf seiten unserer Freunde, auch wenn die Pflanzen dadurch z. T. zunächst etwas kleiner sind. Sie holen es durch freudiges Anwachsen doppelt nach gegenüber den in die Breite gegangenen Pflanzen, die von billig arbeitenden Gärtnereien aus dem Freiland geliefert werden und in den hiergegen empfindlichen Arten dann lange herumkümmern oder gar eingehen. Sofern sich außen an den Ballen dichte Wurzelfilzschichten finden, empfiehlt es sich, diese mit einem Hölzchen vorsichtig aufzulockern, damit die Hauptwurzeln nach der Pflanzung schnell in den Boden eindringen können.

Preise ungültig

LUDWIG HERMS

Anzuchtstätte für Schmuckstauden

Eutin/Holstein, Plöner Straße 73

Mitglied

der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues Berechtigt zur Führung des Gütezeichens »Deutsche Qualitäts-Stauden«



Inhalt:

Zeichenerklärung	2. Umschlagseite
Zur Einführung	Seite 2
Neuaufnahmen	3
Alphabetische Gesa	mtliste:
Niedrige und hohe Blütenste	auden 5
Freilandfarne	39
Heidekräuter	40
Schmuckgräser	40
Zwerggehölze	42
Stauden-Zusammenstellung	43
(Verkaufs - Sortimente)	
Verkaufs- und	
Versandbedingungen	3. Umschlagseite

Auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Hamburg erhielten wir folgende Auszeichnungen: Staatspreis in Silber, Goldmedaille, Silbermedaille, 2 Bronzemedaillen, 3 Diplome

Zur Einführung

Die neue Art unseres Kataloges hat viel Anklang gefunden. Auf Bebilderung zwar haben wir verzichtet. Bilder können immer nur einen winzigen Teil des großen Sortimentes verdeutlichen. Dafür haben wir aber dem Katalog einen Umfang gegeben, der es ermöglicht, die ganze Fülle der Pflanzen wenigstens mit einem Mindestmaß beschreibender Angaben zu versehen, teils sogar recht ausführlich zu besprechen. Wir glauben, daß auf diese Weise die zur Verfügung stehenden Mittel in einer Art angewandt sind, von der unsere Freunde sachlich und menschlich mehr Gewinn haben, als von einer kostspieligen, äußeren Aufmachung, die letztlich nur dem Werbeeffekt dient.

Es ist seit jeher ein besonderes persönliches Anliegen von uns, nach den verschiedensten Gesichtspunkten der Pflanzenverwendung, der Gartensituationen und der künstlerischen und handwerklichen Zwecke unser Sortiment immer erneut durchzuarbeiten und abzurunden.

In ähnlicher Weise bemühen wir uns, unseren Freunden gewisse Hilfen hinsichtlich der Standortwünsche und der Verwendung der Pflanzen zu geben, wenn auch der Rahmen eines Kataloges dem naturgemäß relativ enge Grenzen setzt.

Neben der guten Abwägung des großen Allgemein-Sortimentes legen wir hier auf die Kultur seltnerer Pflanzen besonderen Wert. Die Lage unserer Gärtnerei am Ufer eines der vielen Seen der holsteinischen Hügellandschaft gibt uns durch die feuchte Luft, in Verbindung mit günstigen Baumbeständen die Möglichkeit, grade auch besonders wertvolle Halbschattenstauden in schönen Beständen anzuziehen. Sie würden uns eine Freude machen, wenn Sie uns bei gegebener Gelegenheit hier besuchten. Eutin liegt mit guten Verbindungen auf dem halben Wege zwischen Lübeck und Kiel. Die Gärtnerei ist nur 10 Minuten vom Bahnhof entfernt, also sehr leicht zu erreichen.

Zum Schluß noch eine Bemerkung. Sortenechtheit und gute Qualität der Pflanzen sind Selbstverständlichkeiten, über die eine bekannte Spezial-Staudengärtnerei keine Worte zu verlieren braucht. Aber die beste Qualität nutzt nichts, wenn nicht eine ganz sorgfältige und verantwortungsvolle Verpackung dazu hilft, die Güte der Pflanzen unvermindert bis zu dem Augenblick zu bewahren, da sie wieder in die Erde kommen. Wir dürfen für uns in Anspruch nehmen, in die Erfüllung grade dieser Notwendigkeit unseren ganzen Stolz zu setzen.

Alles in allem: wir freuen uns darauf, Ihre Aufträge, ob klein oder groß, so ausführen zu können, daß Sie freundlich an uns denken werden.

Ergänzungsliste 1955/56 zum Katalog 1954/55

Ludwig Herms, Staudengärtnerei, Eutin

An die Freunde unserer Gärtnerei! Seit Jahren sind die Löhne im Gartenbau und die Aufwendungen für Materia aller Art beträchtlich gestiegen. Wir haben uns deshalb entschließen müssen, au alle Preise unseres Katalogs von 1954/55 und der Zusatzlisten sowie den hand schriftlich geänderten Preisen				
einen Aufschlag von 10 Prozent zu nehmen.				
Ohne Aufschlag gelten die hier genannten Preise für: Epimedium macranthum	1,20			
Trillium, alle Sorten	2,—			
Anemonopsis . Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Preiserhöhung. Trotz aller Schwie keiten bemühen wir uns, die Qualität unserer Pflanzen zu halten.	2,— erig-			
Eutin, im August 1956. Ludwig Herms				
Aconity Figorbut				
Aconitum, Eisenhut O-O				
pyrenaicum. Dieser wenig bekannte, gelbe Wildeisenhut besitzt größte Eignung für Pflanzungen lichtbeschatteter Lagen von einfachem Aufbau. Ab Anfang Juli blühend, bildet dieser Eisenhut im Alter breitwerdende, malerische Büsche mit schönem, urwüchsig gesundem Laub (ca 70 cm hoch) und einer Fülle lichtverzweigter, schmaler Rispen, die mit kleinen, hellgelben Helmblüten dichtbesetzt sind. Gesamthöhe ca. 1,20 m	—,70			
Asthionoma Stainwagal O				
Aethionema, Steinrösel O A grandiflorum, schließt in der Blüte an A. Warley Rose an. Bläulich benadelte Zweige, ca. 25 cm hoch mit zartrosa, höher gebauten Blütendolden. Juni	—,60			
dolden. Juni	,00			
Allium, Blumenlauch () (A)				
pulchellum, Sonnig-trockene Partien von passenden Polstern, Gräsern				
und Kleinstauden mit dieser feinvioletten Blumenlauchart spätsommer-				
lich reich durchstreut, haben einen eigenen, lockeren Reiz. Auf ca. 50				
bis 60 cm hohen, zäh schlanken Stielen lose Dolden kleiner, tropfen-				
förmiger Blüten, intensiv rosa-violett. Kann trotz aller Zierlichkeit				
ganze Pilanzungen des Hochsommers auf Wochen benerrschen. Liatris-				
pulchellum. Sonnig-trockene Partien von passenden Polstern, Gräsern und Kleinstauden mit dieser feinvioletten Blumenlauchart spätsommerlich reich durchstreut, haben einen eigenen, lockeren Reiz. Auf ca. 50 bis 60 cm hohen, zäh schlanken Stielen lose Dolden kleiner, tropfenförmiger Blüten, intensiv rosa-violett. Kann trotz aller Zierlichkeit ganze Pflanzungen des Hochsommers auf Wochen beherrschen. Liatris-Farbe. Ab Ende Juli durch den dreiviertel August, z. B. mit Inula ensifolia. Ausbreitung durch Selbstaussaat. Stark und dauerhaft	-,40			
iona. Ausbreitung durch Seibstaussaat. Stark und dauernatt	-,10			
Anemone, Anemone \bigcirc				
apennina, schönes Apennin-Windröschen mit großen, feinstrahligen Stern-				
blumen von ebenso weichem, wie kräftigem Mittelblau. Knolliges Rizom. Folgt der wesentlich früheren A. blanda im April-Mai. 15 cm. Zeit der Epimediumblüte, Trillium, Tiarella usw. nemorosa Robinsoniana, eine zartviolette und großblumige Form des heimigisch est Buschwirden eine Zeit wir necht Jahren des Febbles wie				
zom. Folgt der wesentlich früheren A. blanda im April-Mai. 15 cm.	-			
Zeit der Epimediumblüte, Trillium, Tiarella usw.	-,60			
nemorosa Robinsoniana, eine zartviolette und großblumige Form des				
neimischen buschwindroschens, die wir nach Jamen des Femens wie-	00			
der anbieten können. März-April. 15 cm	-,80			
Anthemis biebersteinii, Silberkamille				
Aus niedrigem Silberfiligran steigen Goldblütchen. Für Trockenhänge				
und Steingärten. Mai-April	-,60			
Automicia Waymut Edalrauta				
Artemisia, Wermut, Edelraute Operation of the pontiva. Das silbrige Graugrün des Steppenwermutes mit seinem sehr fein zerteilten Laub vermittelt wunderbar ausgewogene und beruhigende Anblicke. Man kann diese Raute nicht zur Einzelpflanzung, gar zwischen kleineren Stauden empfehlen, denn es gehört zu ihrer Natur, daß sie durch Ausläufer ganze Bestände der 60–70 cm hohen, werde der der der der der der der der der				
pontiva. Das shorige Graugitta des Steppenwermutes int seinem sein				
fem zertenten Laub vermitteit wunderbar ausgewogene und berum-				
gende Anblicke. Man kann diese kaute incht zur Einzelpflanzung,				
Notice del sie durch Augläufer ganze Bestände der 60. 70 am hohen				
meter sonnigster Lage, vielleicht in Anlehnung an Gehölze, wie Ginster und Berberitze (Herbstrot zum Graul) zu ruhiger Wirkung frei				
ster und Berberitze (Herbstrot zum Grau!) zu ruhiger Wirkung frei				
Höhere Astern, Königskerze, Goldrute, Edeldisteln, Gräser, Silber-				
Höhere Astern, Königskerze, Goldrute, Edeldisteln, Gräser, Silberminze u. ähnl. Würzig-harziger Laubgeruch	-,80			
Asphodeline lutea, Junkerlilie				
Aus dem blau-grünen grasartigen und schwungvollen Blattschopf ent- wickelt sich auf hohem Schaft die 50-60 cm lange, mit gelben Sternen be-				
setzte Blütenähre im Juni-Juli. Mit Gräsern auf sonnigen Hängen eine				
ausdrucksvolle Erscheinung	-,80			
Aster				
n. a. Harrington Pink, 120 cm, Sept. helles Rosa, silberner Schein, eine	-,80			
gute Bereicherung n. b. Winston S. Churchill, 100cm, September glühend tiefrot, 5 cm große	,00			
Blüte	1,20			
subcoeruleus Sternschnuppe, bis 40 cm, Mai-Juni sehr reichblühend, dun-				
kellavendelblau	1,-			

", nadligen" Laub zu einem kleinen straffen Busch auf und ist im Stein- und Wildgarten zu Inula ensifolia der entsprechende Partner. Juli- August, bis 30 cm hoch	0
Athamanta matthioli, Augenwurz	
aus überaus fein gefiedertem hellgrünem Laub erhebt sich eine weiße Schirmblüte, ein Wildreiz von außerordentlicher Zartheit. Ein Geselle zu Scabiosa graminifolia und Campanula rhomboidalis, Juni-Juli	0
Aubrietia, Blaukissen () \(\lambda \)	
deltoides Schloß Eckberg, eine außerordentlich wertvolle Sorte von starkem, gedrungenem Polster, wie es leider die meisten großblumigen Zuchtsorten nicht haben, und einer schönen Lavendelfarbe der reich erscheinenden, großen Blüten. Erinnert an eine vergrößerte "tauricola", ohne diese in ihrem besonderen Wildreiz etwa überflüssig zu machen. April-Mai. 5—10cm deltoides Eos, zartrosa deltoides Vesuv, karminrot	60
Azorella Starr-Moos O-0 A	
Azorella, Starr-Moos O-O A trifurcata. Das sommerlich und winterlich gleich tiefe, ledrige Grün dieser im Alter mächtigen und verholzenden Polster hat für bestimmte Aufgaben starker und ruhiger Bodendarstellung größte Bedeutung. Sie setzen sich aus geschlitzt-blättrigen Rosetten zusammen, die den Eindruck eines starren, bultig-schwellenden Mooses bis in die heiße Sonne tragen. Im Juni von winzigen, dichtaufsitzenden, goldgrünen Sternblütchen bestickt, welche weniger nach "Blüte", als nach "Muster" wirken. Man kann die Polster auch von blauen Zwergglockenblumen (gleiche Blütezeit) durchblühen lassen. Einmal dazwischengepflanzt und eingewachsen, steigen diese durch die harten Gewebe hindurch. ca. 15 cm	60
Campanula, Glockenblume O A	
rhomboidalis, feinstielige Wildglockenblume, blau, ca. 50 cm, Juni. Wieder lieferbar	0
Centaurea, Kornblume, Flockenblume \bigcirc \triangle	
pulcherrima, niedrige, zartrosafarbene Flockenblume über hellsilber- grauemBodenlaub von ungewöhnlichem Reiz. 40 cm. Juni. Gehört in sonnig-trockene Lagen zu Zwergjohanniskraut, Glockenblumen, ent- sprechenden Polstern usw	80
Cytisus purpureus incarnatus	
50 cm hoch. Mai-Juni	0
caesius, Hybriden. Da Polsternelken dieses Typs oft in großen Massen gebraucht werden, bieten wir auch aus Samen gezogene Pflanzen an, die etwas billiger sein können, als die echt vermehrten Sorten. Variieren von hell- und dunkelrosa bis zu weiß mit rotem Ring und gelegentlich roten Farben. Juni. 20—25 cm. arenarius, eine weiße Wildnelke für selbst dürftigsten Sandboden, stark duftend. 15 cm. Juni. Dictamnus fraxinella albi florus, die weiß-blühende Form. Eriophyllum caespitosum, 20 cm. Blätter grauweißfilzig, margeritenähnliche gelbe Blüten, üppiger Blüher, 6—7.	0000
Doronicum, Gemswurz, gelbe Frühlingsmarguerite O-O	
caucasicum magnificum, stellt die bekannte Art in einer ganz besonders wüchsigen Form vor, welche nicht nur üppiger, sondern auch etwas höher ist und etwa 10 Tage später blüht, — sonst aber den Typ der schönen Frühlingsmarguerite "unverdorben" bewahrt. Der stärkere Wuchs ist natürlich recht wertvoll. Scheint auf die Dauer D. cordifolium, das noch etwas höher und später, dabei aber u. E. weniger ausdrucksvoll ist, überflüssig zu machen. 50—60 cm. Mai	60
Echinops, Kugeldistel ()	
ritro, man mag und kann die altvertraute Erscheinung mit ihren licht- stahlblauen, kugelförmigen Blütenständen im Juli-August nicht ganz entbehren, auch wenn sie nicht überall hinpaßt. Schöngeschnittenes, unterseits silbriges Laub. In spätsommerlicher Hitze von unzähligen Bienen besucht. 130—150 cm	0.
Erigeron, Feinstrahlaster	
hybr. Violetta. Diese sattviolette Arends'sche Züchtung hat schnell ihren Eingang in die Sortimente gefunden und belebt durch ihren tiefen Ton auf sehr erwünschte Weise die Skala der anderen Erigeron-Farben. Reizvoll gefüllte Blumen. 60—70 cm. Juli . —,80	0
Filipendula, Spierstaude \bigcirc \triangle	
hexapetala, Farnspiere. Aus farnähnlich gefiedertem, schönem Laub, das in dichter Rosette dem Boden aufliegt, steigen die flachen Rispen dieser bezaubernden Wildpflanze, ca. 40 cm, Juni. Knospen oft rosa überhaucht, Blüten eremeweiß. Im Gegensatz zu den "Spiräen" feucht- halbschattiger Vorliebe (Astilben), mit denen sie auch im Aussehen	

nichts gemeinsam hat, und den anderen Filipendula ist sie eine ausgesprochene Erscheinung trocken-sonniger Gesellschaft mit Polstern, Gräsern und harten Kleinstauden, (z. B. Veronica, Nelke, Johanniskraut, Aster amellus, Inula usw.)	-,60
	and the
Gillenia trifoliata, Waldstaude 70 cm, buschiges braungrünes Blattwerk mit kleinen weißen, duftig verteilten Blüten. Eine Bereicherung für den Halbschatten, Juni	—,70
Gladiolus, Wildgladiole (
imbricatus. Auf ganz durchschnittlichen Gartenboden blühen hier jedes Jahr im Juni — durch Selbstaussaat sich immer weiter verbreitend — unzählige dieser zierlichen Wildgladiolen aus dem niederen Stauden- werk einer natürlichen Partie; aber selbst durch die Lücken zwischen gröberen Stauden schieben sich die schlanken, rosavioletten Rispen	
hindurch, schweben über blühendem Schleierkraut (Gypsophila monst- rosa) und stellen auf faszinierende Weise dar, welch tief verwan- delnde Wirkung von der echten, nämlich wildblumenhaft lockeren "Streustaude" ausgehen kann. 80—90 cm. Zieht gegen Herbst ein.	-,39
	,00
Haquetia, Schaftdolde (—,60
Helianthus, Stauden-Sonnenblume	05,713
salicifolius, die weidenblättrige oder Papyrus-Sonnenblume gehört zu den mächtigen Stauden, ohne die manche Gartnaufgabe ungelöst bliebe. Bis 2 m aufstrebend, durchsichtig mit schmalen, weidenarti- gen Blättern besetzt, — bei aller Höhe und Ueppigkeit der alten Pflanze also doch leicht und formschön. Paßt sich bestimmten Wasserrand-	
plätzen gut ein. Nähe starker Gräser und Blattstauden. Im Oktober gekrönt von Sträußen kleiner gelber Blüten	-,80
Inula, Alant O-D A	
glandulosa grandiflora. Große, intensiv orangegelbe, strahlige Scheibenblüten über 40—50 cm hoher Staude mit kräftigen, wollig-grünen Blättern. Eine ausdrucksvolle Erscheinung des Juni. Ihre rechte Wirkung erzielt man erst, wenn man sie nicht als bloße Variante in der bunten, vielfältigen Masse des Juniblühens ertrinken läßt, sondern an etwas stillere Orte rückt, — etwa halbsonnig mit Gräsern und der Knäuelglockenblume	,70
Leucanthemum, Staudenmarguerite (
maximum Wirral Supreme, eine Neuheit mit großen, festgefüllten Blumen, die z.B. als sehr haltbare Schnittblume von vielen außerordentlich begrüßt werden wird. Hohe, starke Stiele. Juli. ca. 90 cm	1,20
Lupinus, Staudenlupine (
polyphyllus, blau. Die Staudenlupine wird für Gestaltungsaufgaben, die keine zu große Buntheit vertragen, und bei denen es nicht auf die Gleichmäßigkeit aller Individuen ankommt, oftmals in ihrer blauen Wildform gebraucht, welche zur Pfingstzeit draußen an vielen Waldrändern, Bahndämmen usw. in Massen blüht und in verschiedenen	
blauen und blauvioletten Tönen spielt	-,60
Juni, ca. 1 m	1,20
Paeonia peregrina eine Wildpaeonie, ähnlich tenuifolia, etwas größer und gröber im Blatt. Trägt seine schöne, einfach rote Blüte an 70 cm hohen mit Blät- tern locker besetzten Stielen. Mai-Juni	1,50
Peltiphyllum peltatum, Schildblatt April-Mai, nach den rosafarbenen Blüten entwickelt sich das mächtige Blattwerk bis 120 cm hoch. Schattiger, nicht zu trockener Standort	1,—
Phlox pan. Pastorale	
Dieser gesunde Foerster-Phlox überrascht einen mit seinem warmen und gleichzeitig frischen rosa Farbton, 70 cm	1,20
Polygonum, Knöterich O-D sericeum. Hier handelt es sich um einen nicht wuchernden, insofern ganz "ungefährlichen" Staudenknöterich, der jedoch allmählich mächtige Büsche aufbaut und in der zweiten Maihälfte seine hohen, spiräenhaft verzweigten, weißen Rispen entfaltet. Schmalblättrig. Hohes Weiß fehlt sonst um diese Zeit fast völlig. In naturüppigen Pflanzungen kann dieses schäumende Blühen — sparsam verwendet und mit genügend Raum, etwa zusammen mit blauer Akelei und Tränendem Herz — von großem Wert sein. Trifft zuweilen noch die ersten hohen, blauen Iris. In der	—,80
Blüte bis 1,20 m	-,00

Clive Greves, bis 70 cm hoch, ab Ende Juni bis Spätsommer blühend, hellblau	1,—
baicalensis, bis 70 cm hoch, farbig, die schönste Scutellaria, klares Blau- violett, ein erfrischender Augustblüher für Sonne	-,60 -,70
cauticolum, ist unter den niedrigen, herbstblühenden Fetthennen zweifellos etwas erstrangig Schönes. Steht in der Tracht S. sieboldii sehr nahe, ist aber viel wüchsiger und von großer Dauerkraft. Die Farbigkeit des Laubwerks zieht sofort alle Blicke auf die Pflanze. Über dem rotgeränderten Bläulichgrün der Blätter liegt, besonders im Frühsommer, ein tiefer violetter Hauch. In seiner besonderen Eigenart unbeschreibbar. Die verzweigten, rosaroten Blütendolden legen sich zu geschlossenen Farbkissen zusammen, — wohl der intensivste Eindruck, den der September im Steingarten zu bieten hat. In dieser Jahreszeit ist jede neue wirksame Erscheinung eine Kostbarkeit. 10—15 cm. — spurium album superbum, ein gutes, dichtes Polster bildendes, warmgrünes Sedum, wichtig, weil es auch gut im Halbschatten steht . spurium Purpurteppich, ein schöner purpurrotbrauner Teppichbildner, ausdrucksvoll durch seine kurzen, fast rosettenartigen Triebe, Juni-Juli album micranthum, nur 5 cm hoch, frischgrüner Rasen .	—,60 —,50 —,50
Stachys, Ziest \bigcirc \triangle lanata. Man kann den Wollziest (Eselohr) nicht entbehren, wo kräftigen Pflanzungen in sonniger und trockener Lage breite Grau-, bzw. Silbertöne einzufügen sind, ohne daß man viel Pflegeaufwand mit unkrautgefährdeten, feineren Polsterpflanzen auf sich nehmen will. Dickfilzige, silbergraue Blätter an äußerst robuster Staude, ca. 20 cm. Die violetten Blütchen sind unwesentlich, die silbrigen Blütenstände im ganzen jedoch, die die Flächen kerzenartig durchbrechen, besitzen großen Linienreiz. Auch als Einfassungspflanze seit langem beliebt .	-,50
Trollius, Trollblume, Goldranunkel O-O Seuropaeus superbus. Das zarte, ganz helle Gelb dieser Sorte ist zur Abstufung der sonstigen schweren Gold- und Orangetöne bei der Trollblume sehr erwünscht. Nimmt man die besonders schöne "Rosenform" der Blumen hinzu, so haben wir es hier mit einer der edelsten Erscheinungen im Bereich der Trollblumen zu tun. 70 cm, Mai-Juni, etwas später als die anderen Sorten.	_,80
Verbaseum, Königskerze () hybr. Cotswold Queen, ist eine Parallelsorte zu "Pink Domino" und zeigt sich in einem feinen, gedeckten Hellbraun mit violetten Staubfäden, das die meisten Menschen sehr stark anspricht Juni-Juli. 1,20-1,50 m. Es ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, daß die Blüten unfruchtbar sind, die Pflanze sich also nicht so wild aussäen kann, wie es andere Königskerzen tun . Viola cornuta Angerland	,70
ein frischblaues, großblumiges Hornveilchen, von Mai bis September voll blühend, 10 cm	-,80
Viscaria vulgaris (Lychnis viscosa) einfache Pechnelke, über und über karminrot blühend, nicht lümmelnd, Juni-Juli. Samenträger abschneiden!	-,50
Vinca, Immergrün 🕒 minor. Das bekannte, heimische Immergrün der Wälder bildet im Schatten luftige Rankenteppiche mit kleinen, ledrigen Blättern, die auch im Winter tiefgrün bleiben, und schönen blauen Blüten im April-Mai. 20—25 cm. Wird in den Gärten in steigendem Maß verwendet, weil es zu den absolut dauerhaften Bodengrünern des Schattens auch in schwierigen Lagen gehört	-,50
Selten angebotene Liebhabersorten für die Sonderanlage	
Carlina acanthifolia, 20 cm, sehr sonnig, trocken Anthyllis montana, Bergwundklee, Juni Aquilegia discolor, 15 cm, blau-weiß, Juli Draba dicranoides, 5 cm, gelb, März-April Gentiana lutea, 3jähr. Pflz. aus T., ca. 140 cm, gelb, Juli, tiefgründiger Lehm, auch etwas schattig	-,60 -,70 -,80 -,60 -,50 -,80
Ranunculus amplexicaulis, steinig-lehmig, weiß, Mai, 25 cm gramineus, sonnig, leicht gedeihend, 25 cm, Juni Scabiosa graminifolia, zart-violett, 30 cm, Juli-August	1,— 1,10 —,70 —,80 2,—

Neuheiten und Neuaufnahmen 1954/55

Aster, Aster \bigcirc \triangle	
dumosus Prof. Kippenberg. Selbst bei vorsichtigem Urteil muß diese Neu- einführung der letzten Jahre als etwas sehr Besonderes gelten. Sie bildet starke, bis 60 cm hohe, aber schön geschlossene Büsche von einer geradezu leuchtenden Farbwirkung der Blüte. Im knospigen Zustand (ca. Mitte Sept. erblühend) kräftig violett, zeigen die offenen Blumen ein warmes erfrischendes Blau mittlerer Tiefe, wie man es bei Aster dumosus sonst noch nicht gesehen hat. Bisher sehr gesund	-,80
Centranthus, Spornblume ()	
ruber albiflorus. Will man das schaumige Rispenrot der Spornblume, die für viele Aufgaben des Juni schlechthin unentbehrlich ist, zu schönster Wirkung bringen, so füge man ihm die weiße Form hinzu. Hier wird vom Farblichen her der Ausdruck der ganzen Leichtigkeit dieser schlank und lichtgebauten Wildstaude erst recht zum Schwingen gebracht	,50
Digitalis, Fingerhut	
lutea. Wir haben immer wieder den Wert des gelben Fingerhutes, Digitalis ambigua, als echter Staude betont und haben dieser schönen, wichtigen Pflanze gegenüber unsere Meinung nicht geändert. Dig. lutea, den wir heute empfehlen, hat andere Verdienste. Auch er ist ausdauernd. Mit seinen zierlichen, weißgelben Rispen, welche dicht gereiht aus vielen kleinen Glöckchen fast wie Perlenschnüre wirken, ist er einer der Streustauden, welche nirgendwo stören und natürliche Partien des Juni-Juli auf die reizvollste Art beleben. Halbschattig bis sonnig. Langsam emporgeblüht bis 1 m, aus schönem, schmalem Bodenblattwerk, das noch etwas in die schlanken Rispen hineinsteigt	—, 50
Hutchinsia, Gemskresse →- △	
auerswaldi. Wie oft wird bei uns nach Kleinpflanzen gefragt, welche absonnig-lichtschattige Lage im Steingarten vertragen und dabei doch irgendwie feinwüchsig sind, nicht "grobe Schattenkräuter". Neben den in dieser Richtung schon vorhandenen, sehr schönen und noch viel zu wenig beachteten Dingen wie zarten Felsenfarnen, Ramondien, Selaginella, Wildalpenveilchen, Soldanellen usw. ist die kleine Gemskresse eines der entzückendsten. Ein ganz flaches, dunkelgrünes Polster aus fein gefiederten Blättchen trägt im April schneeweiße kleine Dolden. Die Pflanze verträgt aber auch sonnigere Lage	-,60
Iris, Iris (
Wilsonae. Eine seltene, aber äußerst lebenskräftige Wildiris, welche dem Typ nach in die Nähe der sibirischen Iris gehört, nur etwas niedriger ist. Grasartiges Laub, feingebaute, hellgelbe Blüten im Anfang Juni, ca. 60 cm	—,7 0
Mimulus, Gauklerblume ○ △ ≌	
hybr. Scarlet Bee, eine sehr gute niedrige Hybridsorte der Gauklerblume. Die nur 25 cm hohen Büschchen, die an den halb liegenden Zweigen wurzeln und dadurch schnell in die Breite wachsen, tragen verhältnismäßig große Blumen von schöner, samtig-kupferroter Farbe durch lange Juni- und Juliwochen. An bodenfrischen, aber sonnigen Stellen zusammen mit den goldgelben Glockenteppichen des "Pfennigkrautes" (Lysimachia numularia), Sumpfvergißmeinnicht und zugehörigen Dingen ähnlicher Art eine wichtige Bereicherung	-,60
Orobus, Frühlingswaldwicke ()	
vernus roseus — das tintig-blaue Verblühen der sonst schönen, violetten Stammform ist so störend, daß diese für anspruchsvolle Verwendung kaum in Frage kommt. Die seltene hellrosa Form dagegen, die wir endlich anbieten können, trägt in die waldfrühlingshafte Blüte der April-Maiwende (mit Trillium, Waldschaumkerze, feinviolettem Zahnwurz, weißen und hellgelben Epimedien usw.) einen zarten und unersetzlichen Reiz. Ca. 40 cm. Die geradezu unverwüstliche Zähigkeit der ganzen Art, die im Lauf der Jahre ansehnl. Büsche bildet, ist bekannt	—, 80

Panicum, Rutenhirse Ovirgatum. Mit der "Rutenhirse" fügen wir unserem Gräsersortiment eine wichtige und schöne Erscheinung ein. Die braune "Zittergrasblüte" im Spätsommer steht über lichtem, schlankstieligem Busch mit schöngeschnittenen Halmen, welche zum Herbst hin teilweise in tiefen Broncetönen ausfärben. 1 m	-,80
Polygonum, Knöterich ()	
bistorta. In breiteren Pflanzungen, deren Charakter etwa durch Trollius, Taglilien, Gräser usw. gegeben ist, kann dieser Knöterich mit seinen weißrosa Kerzenmassen im Juni eine bedeutsame Rolle spielen, weil es nicht zu viele Erscheinungen gibt, welche in füllender, licht-flächiger Wirkung in solche Charaktere hineinpassen. Recht sonnig und bodenmäßig nicht allzu üppig stellen, damit die Blütenstiele, wie in den Wiesen, straff bleiben. Höhe der Blütenstiele ca. 80 cm, des grundständigen Blattwerks, auf dem ja der Vor- und Nachblüteneindruck beruht, 30 — 40 cm	,60
Sempervivum, Steinrose 🔾 🛆	
hybr. Rubin, eine Steinrosensorte, die allein schon vom Farblichen her eindringliche Wirkungen ausstrahlt. Ihre mittelgroßen bis großen Rosetten beginnen im März/April ein herrliches, tiefglühendes Rot anzunehmen, das sich erst im Juli wieder abschwächt, um dann einem gedämpften, rötlichbraunen Ton Platz zu machen. Dieses Rot, an feingliedrigen Steinplätzen geschickt mit grauen und silbrigen Kleinpflanzen in Zusammenhang gebracht, ist in seiner Eigenart etwas sehr Beschäftigendes	,60
Verbascum, Königskerze ○	
hybr. Pink Domino. Die rosaviolett blühende Kultursorte aus dem Reichder Königskerzen bringt, ähnlich wie die bräunliche "Cotswold Queen", mit ihren verzweigten Kerzen eine eigenartige Farbnote in den Juli-August. Bis 1 m. Derbes, grünes Laubwerk, ähnlich V. densiflorum	—,70

Niedrige und hohe Blütenstauden

Alphabetische Gesamtliste

Folgende Liste enthält neben den Lilien auch einige andere Blumenzwiebeln. Letztere werden für den Spätversand und das Frühjahr in Töpfen bereitgehalten, damit sie auch dann gepflanzt werden können, wenn es ohne Ballen nicht mehr möglich wäre. — Gräser, Farne und Zwerggehölze, sowie Schneeheide siehe hinten. — Beachte die Erklärung der Zeichen, welche in Kurzform gewisse Hinweise auf Standort und Verwendung der Pflanzen geben. — Wem die Auswahl der gewünschten Pflanzenarten und -sorten aus dieser umfangreichen Gesamtliste zu schwierig erscheint, bediene sich bitte der "Staudenzusammenstellungen", die wir für bestimmte Standorts- und Verwendungszwecke sorgfältig durchdacht haben. Sie sind außerdem noch verbilligt.

Ac	hillea, Edelgarbe, Schafgarbe W	
1	l. Polsterarten 🛆	
	Alle untenstehenden Arten sind silbergrau, mit feinem aromatischem Lb., Blüte weiß, schönstes Material für sonnig-trockene Charakterpflanzungen und Steingärten	
	ageratifolia, mehr grau als silber, 10 cm, Mai/Juni Die Polster dieser Art sind besonders haltbar und auch nach vielen Jahren noch fest. Deshalb empfehlen wir die Art warm	— ,50
	serbica, mehr silber als grau, mächtigere Polster, ca. 20 cm, großblumig, Mai/Juni, mit Sedum, Campanula, Nelken	—,50 —,50
2	2. Hohe Edelgarben	
	cilipendulina, Parker's Var. Goldgarbe, 120 cm, Juli	,60
	Die weißgefüllte Schafgarbe, 75 cm, Juni-August, auch feuch-	—, 50
Ac	conitum, Eisenhut O-O	
	napellus bicolor, reizvoll zweifarbig blauweiß, 7, 120 cm — Spark's Var., schönster dunkelvioletter Eisenhut, mit großen	—,7 0
	verzweigten Rispen, Juli/August, bis 180 cm, mit Tigerlilien, Goldrute, Helenium, Phlox, Helianthus	-,70
	Wilsonae, lichtblauer Herbstblüher, ab 20. Sept., 170 cm	-,80
	taea, Christophskraut ()-() alba, eindrucksvolle weißbeerige Waldstaude mit roten Frucht-	
	stielen, ab 20. August, 100 cm, Einzelgestalt über Epimedium- flächen, Luzula silvatica, Tiarella cordifolia usw. Wichtige Herbstfarbe in Halbschatten-Pflanzungen	1,00
Ad	lonis, Adonisröschen () ()	
	amurensis, goldgelbe Vorfrühlingsadonis, Febr./März, eine der schönsten frühen Blumen. Die Blüten vertragen bis 10 Grad	
	Frost, 20 cm hoch, Laub zieht im Juli ein	1,50
1	vernalis, seidengelbe Steppenadonis, glänzende Schalen über feinstem Laub. 25 cm. April. mit Pulsatilla 🛇	1,20

Aethionema, Steinrösel ∞ \triangle	
hybr. Warley Rose, verholzendes, dicht-nadelblättriges Zwerg- polster mit warmrosa Blütendolden, Mai, 15 cm	,60
Ajuga, Günsel O-O A	
reptans atropurpurea, üppige, rötlichgrüne Blattpolster, blaue Blütenkerzen im Mai, 15 cm, wichtiger Bodendecker auch für trocken-halbschattige Lagen	,40
Allium, Blumenlauch () \(\triangle \) Hübsche und interessante Zwiebelgewächse mit schmälerem oder breiterem grasartigem Laub, das meist nach der Blüte einzieht, für warme, sonnige Lagen, auch sandige Böden.	
cyaneum, feine, grasartige Polster, zieht nicht ein, 15 cm, hell- blaue Köpfchen, Juli-August	—,50
tendolden, ca. 30 cm, Juni. Wirkungsvoll in Menge. Selbstaussaat!	-,30
narcissiflorum, schmaleres Laub, kleine Dolden mit nickenden, großen Blütenglocken, schön rosapurpurn, 15—20 cm, Juni .	-,60
Alsine, Granatmiere ○ △ laricifolia, dichte moosgrüne Polster, Bl. quellend weiß, 10 cm,	
Juni/Juli, eine der späten, anspruchslosen Polsterpflanzen	-,50
Alyssum, Steinrich ♥♥	— ,50
saxatile, goldgelb, Mai, 30 cm	—,50 —,60
Althaea, sibirische Fingermalve (Stockrose)	
ficifolia, eine mehrjährige schöne Wildart mit gelappten Blättern und meist rosa bis dunkelroten einfachen Blüten. Juli/August, bis 1,80 m	—,5 0
Anaphalis, Silberimmortelle CO	
margaritacea, schmalgeschnittenes silberweißes Laub, weißgoldene Blütenköpfchen. Prachtvoll rassige Erscheinung, trockensonnige Lage, 60 cm, Juli/August. Dehnt sich stark aus, breitflächig pflanzen! Mit Liatris, Rudbeckia Goldsturm, Campanula carpathica, Helenium Crimson Beauty, Avena candida, Festuca	— ,50
The state of the s	Set &
Androsace, Mannsschild ○ △ Diese Gattung spinnt Teppiche von reizenden, z. T. silbrigen Rosetten, denen zartgestielte Blüten-Dolden entsteigen. Der Feinheit der Erscheinung entspricht größte anspruchslose Ausdauer.	
primuloides, hellrosa Blütendolden, 10 cm, Mai	
Watkinsii, dunkelrosa, besonders gedrungen und stark, MaiT	-,50
tanuginosa, diese niederliegende Triebe bildende Art mit ihren weißen, rotgeäugten Blüten wird uns dadurch besonders lieb, daß sie bis in den Sept. (also die stillen Zeiten des Steingartens)	
hinein blüht	-,60

Anchusa, Raukasus-vergibmeinnicht O-	
myosotidiflora, leuchtendblau, 40 cm, April/Mai, üppig-starkes Blattwerk, unschätzbar gerade für schwierige Halbschatten- plätze	-,60
Anemone, Anemone	
1. Niedrige Arten ○-① △	
blanda scythinica, Vorfrühlings-Knollenanemone, lange blühend, weiß mit blauer Unterseite, 3/5, 10 cm, 3 Knollen im Topf	,60
narcissiflora, weiße Doldenanemone, Mai-Juni, 40 cm, verträgt auch lichten Schatten	-,90
nemorosa alba plena, gefüllt blühendes Buschwindröschen, 10 cm, Schatten, weiß	1,00
pulsatilla, Küchenschelle, silberhaarige Knospe, Blüte violett, 25 cm, April-Mai 🔘	-,60
-Weißer Schwan, großblütige weiße Küchenschelle, 25 cm, April	-,60
silvestris, weiße Schalenanemone mit goldener Mitte, 40 cm, Mai	—,60
2. Hohe Arten: Sommer und Herbstanemonen O-	
hupehensis Septembercharme, eine besonders schöne, groß- blumige Sorte der "China-Anemone". Edle, rosa Schalen. Ca. 80 cm, August/September	—,90
japonica Honorine Jobert, hochgestielte Waldanemone, 100 cm, reinweiße Schalen mit goldgelben Staubfäden, von Mitte August in den Oktober blühend, mit Waldpflanzen aller Art, Gräsern, Farnen. Verlangt im 1. Winter nach der Pflanzung Deckung (Laub)	—,70 —,80
vitifolia, der Herbstanemone ähnelnd, mit herrlichem Laub, blüht sie schon Juli/August, verträgt mehr sonnige Lage. Wolken rosafarbener Schalenblüten lagern über den mächtigen Pflan- zen und ihrem verzweigten Stielwerk. Schön mit Senecio. Un-	—,60
Anemonopsis, Scheinanemone	
macrophylla, sehr seltene Pflanze für frischen Halbschatten. Porzellanartige weiße Blüten mit hellila Hauch, leicht aufgehängt an schlanken, geneigten Stielen, 70 cm, Juli/August	1,25
Antennaria, Katzenpfötchen ○ - ① △	
aprica. Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß diese stark-wüchsige, bisher von uns als "plantaginea" geführte Art botanisch richtig "aprica" heißt. Sie ist von ungewöhnlichem Wert, wo es sich darum handelt, etwa zu Heide und "trockenen" Sonnenblühern wirklich dauerhafte und unverwüstliche Bodenteppiche von schönstem Silbergrau zu schaffen. Blüten weiß. Mai	,50
dioica rubra, bekannteres Heidekatzenpfötchen, feinwüchsiger. Schön die rote Blüte über hellerem Silber, 10 cm, Mai-Juni	-,40
Anthericum, Graslilie O-1	
ramosum, ab Ende Juni blühen aus 20 cm hohen Grasbüscheln die leicht verzweigten Blütenrispen der Graslilie mit kleinen,	
weißen Sternen. Juni, 50 cm	,70

Aquilegia, Akelei O-()	
coerulea, Mai-Juni, ca. 100 cm, blau	-,50
chrysantha, zartgelbe Spornakelei, Juni, von besonderer Leichtigkeit und Blumenhaftigkeit der fast schwebenden Blüten, trifft noch das Violett von Campanula macrantha	-,50
haylodgensis, ebenfalls eine langspornige Akelei von obigem Reiz und Eigenschaften, aber vielfältiger spielenden Farben bis in	,50
zartes Rosa, gelbrot usw., Juni	-,60
Arabis, Gänsekresse ○ △	
alpina flore pleno, weiß gefüllt, April/Mai, bes. lange blühend, T	-,50
— Rosabella, warmes Rosa	—,50
— Schneehaube, ein guter, gedrungener Typ der einfachen weißen Stammform	,40
teppichen, spinnender Wuchs, für breite Flächen besonders geeignet, ca. 20 cm, April/Mai, D	— ,50
Armeria, Grasnelke 🔾 🛆	
maritima alba, gerade die weiße Polstergrasnelke besonders schön, z. B. mit blauen Alpenastern, Mai-Juni, 15 cm	-,40
— rosea compacta, tiefrosa, bekannte Form, auch für Einfassungen	-,40
Aruncus, Geißbartspiräe ○-① silvester, punkt Mitte Juni erblühen die herrlich belaubten, mächtigwerdenden Büsche mit ihren bis zu 170 cm hohen, weißen Rispen, ein Fest waldhafter Stimmung, an schattigen Plätzen mit der treu folgenden Campanula macrantha, Fingerhut und großen Waldgräsern	,70
Asarum, Haselwurz (▶-● europaeum, bildet dunkel-immergrüne Bodenteppiche, 15 cm, kräftige, kultivierte Pflanzen	—,50 —,20
Asperula, Meister	
hirta, rosa "Bergmeister", weiche, grüne, schmalblättrige Polster, 10 cm, rosa Blütendolden, für Steingärten. Mai-Juni, O A T odorata, der bekannte "Waldmeister" — eine heimische Waldpflanze mit weißen Blütenschirmen über reizenden Blattquir-	-,60
len. Vorzüglicher Bodengrüner im Sch. Mai-Juni, 20 cm () T	-,50
1. Niedrige Frühsommerarten ∧	
alpinus, blaue Alpenaster, 20 cm, große Blütensterne mit gelber	
Mitte, ab zweiter Maihälfte, zu gelbem Helianthemum	
— Treue, mittleres Violettblau, gut in Farbe, Blüte und Bau .	—,70
subcoeruleus floribundus, Himalaya-Aster, ähnelt vorig. Typ, auf höheren Stielen große lavendelblaue Blumen von orangegoldener Mitte, ca. ab 10. Juni, bringt stärkste Wirkungen in frühsommerliche Pflanzungen. Mächtiger Wachser, muß nach Bo-	
denerschöpfung einmal umgepflanzt werden. In zweiter Hälfte der Blütezeit schön mit Oenothera glabra	

2. Niedrige bis halbhohe Sommerund Herbstastern △

am	~1	П.	120

- Blütendecke. Eine der neuesten Züchtungen von Karl Foer-	
ster. Sie bezauberte uns durch die starken geschlossenen	
Büsche, überdeckt von relativ kleinen, sehr festen hellblauen	00
Blüten, 60 cm, Sept./Okt.	,80
— Gnom. Endlich können wir auch diese Sorte, so ziemlich die schönste aller Berg-Herbstastern, anbieten. Starkwüchsig, tief-	
violett mit leuchtend gelber Mitte. Feste, ausdrucksvolle	
Blume, 60 cm, August/September	-,80
- Rud. Goethe, großblumig, lavendelblau, Sept., 60 cm	-,80
	,80
— Hermann Löns, ein helles Lavendelblau, Sept., 60 cm	-,00
— Kobold , dunkel-violett, früh, dichter, gedrungener Wuchs, klein-, aber sehr reichblumig, 50 cm, Sept	-,80
- Mignon, mittelblumig, von bes. leuchtendem Blau, Sept	-,80
— Oktoberkind. Bekannte alte Sorte, die lange fehlte und deren starker Reiz in der späten Oktoberblüte dunklen Violetts liegt.	
50/60 cm	-,80
	,80
- Rosa von Ronsdorf, zartes Rosa, guter Wachser, 60 cm, Sept.	-,00
— Sternkugel, hier haben wir eine außerordentliche Sorte vor uns. Blüte feinstrahlig, sattviolett, ab Mitte Sept. bis Mitte	
Oktober. Aber das Wesentliche ist die Wuchsleistung. Sie ist	
bei gedrungenem, breitem Bau das Doppelte bis Dreifache wie	
bei anderen Sorten, gerade in Lagen, die nicht "amellus-gün-	
stig" sind. Alte Pflanze bis 40 Stiele	-,80
cassubicus, großblumige Wildform vom Amellus-Typ, leuchtend	
blau, August-September, wirkungsvoll	-,80
blad, Ilagabt Deptermen,	
dumosus, "Kugelaster"	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die	dinik E
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farben-	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit.	
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana. prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser	
 dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön 	-,60
 dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober 	—,60 —,50
 dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt 	—,60 —,50 —,50
 dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober 	—,60 —,50 —,50 —,50
 dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt 	—,60 —,50 —,50
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80 —,60
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80 —,60 —,60
dumosus, "Kugelaster" Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster novbelgSorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner besonderen Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des September/Oktober in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30 bis 40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit. — Diana, prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbst, ab Ende September, besonders schön — Dwarf Nancy, zartestes Silberviolett. September/Oktober — Dwarf Viktor, großblumig, lichtblau, fast teppichartig, Okt — Lilac Time, gute, zartlila Sorte, Okt., 45 cm	—,60 —,50 —,50 —,50 —,80 —,60

3. Honere bis none Herbstastern: September-Oktober	
dumosus Blue Bouquet, im Alter bis 90 cm, violettblau	-,60
ericoides, Erlkönig, feinblumig, hellblau, nadelblättrig	-,50
- Herbstmyrte, straffe, weiße Myrthenaster, reizend, niedriger	
als Erlkönig, 100 cm	-,50
- Alsterlust, lichte, feinbenadelte Zweige mit etwas größeren.	
ausdrucksvollen rosa Blüten, 100 cm	-,60
novae-angliae, Barr's Pink, seidenrosa Krallenaster, 150 cm	-,60
- Käte Blomfield, intensiveres Rosa	-,60
novii-belgii, Distelfink, warmrosa, gesund, standfest	-,60
— Durham, gefüllt violett, gesund, besonders wertvoll	-,70
— Maid of Athens, eine alte Sorte, die sich uns durch Gesundheit und Festigkeit neu aufdrängte, weißrosa, halbgefüllt	50
	-,50
Oktoberfest. Leuchtend blaue Herbstastern gehören zum Schönsten und Wichtigsten des Herbstgartens, wenn sie nicht	
zu sehr wuchern, gesund sind und nicht umfallen. Jeder weiß.	
wie selten derart qualifizierte Schönheiten sind, trotz der Sor-	
tenzahl. Hier haben wir eine prachtvolle Neuheit von Karl Foerster: üppig, dabei straff, gesund, nur 120 cm, sättigendes	
Blau, wirklich ein Fest, ab Ende September	-,80
- Taubenblau, ausgesprochen leuchtendes Silberblau, gefüllt,	
stämmig, gesund. Diese Erscheinung ist einfach wunderbar.	
140 cm	-,80
— Beechwood Challenger, moderne, dunkelkarminrote Sorte, der Farbe wegen naturgemäß von höchstem Interesse, nur 80/90 cm	
hoch, September-Oktober	-,60
- Royal Blue, beste alte blaue Frühsorte, großblumig, 140 cm .	-,60
- Snowdrift, halbgefüllt weiß, 130 cm, September/Oktober	-,60
Astilbe, Prachtspiräe ○-① ∾	
Fast alle Astilben lieben Halbschatten und vertragen Sonne	
nur auf feuchten Böden	
1 Niednige Anton Tuli August	
1. Niedrige Arten, Juli-August	
crispa, weißrosa Zwergkerze. Feinstplätze, 15 cm	-,80
simplicifolia elegans, zartlachsrosa, elegant überhängend, 35 cm,	
gute Sonnenfestigkeit in weniger feuchter Lage	—,80 —,80
sinensis pumila, ausläuferbildende Teppichastilbe, violettrosa	,00
Kerzen, 30 cm, August, auch für weniger feuchte Lage	-,60
2. Höhere Formen	
Arendsii, stärkste Farbenspender im Schatten, Juli	
- Amethyst, lichtes Purpurviolett, 100 cm	-,60
- Brautschleier, gelöste, breite Schleierrispen, feingetöntes Weiß,	
besonders für Waldstimmungen im Juli, 90 cm	-,80
— Fanal, beste tiefrote Sorte, 80 cm	-,80
- Hyacinth, hellviolett, mächtige Flauschrispen	-,60
— Rosa Perle, ein ganz zartes Rosaweiß, 100 cm	
— Rubin, warm mittelrot, 100 cm	
Japonica Deutschland, well, pilde dall, liedie, Ol (III).	110

thunbergii moerheimi, anmutige, schön geneigte Rispen, weiß, 100 cm, Juli	-,70
Aubrietia, Blaukissen ○ △	
deltoides Ashed Purple, Violettrot, wie alle folgenden im Mai, T	-,50
- Aubrey Prichard, großblumig, hellavendelblau T	-,60
— Gloriosa, silberviolett, großblumig	-,60
— Leichtlinii Crimson, karminrosa	-,60
— Moerheimi, sehr helles Rosa	-,60
— Peter Barr, tiefviolett	,60
violett, äußerst reichblühend, gesund T	-,50
Bergenia (Megasea) Bergenie O-O	
hybrida, weiße und rosa Formen gemischt. (Nachzucht von Bergenia Strachey). Meist zart weißrosa. April	-,80
Caltha, Sumpfdotterblume ○-① №	
palustris fl. pl., gefüllte goldgelbe Dotterblume, April/Mai	,80
Campanula, Glockenblume	
1. Niedrige Arten ○ △	
carpathica, großblumig, blau, bis 40 cm, Juli-August	-,50
— alba, schöne weiße Form voriger	-,50
— Karpathenkrone, wertvolle Neuzüchtung, gedrungen, kaum 30 cm, eine Fülle lichtblauer Sternschalen überdeckt die fest-	
gebauten Büsche, ab Juli	-,70
garganica, 35 cm breite, flache, hellblaue Sternglockenpolster, wertvoll im Steingarten, Juni-Juli	-,60
Portenschlagiana, dalmatinische Polsterglockenblume, violett, zweimal blühend, Juni und August, 15 cm, sehr wertvoll T	-,60
pusilla, hellblaue Zwergglocke, nickend an feinsten Stielen, 10	
cm, zarter Naturreiz, Kriecher. Verpflechtung mit Dryas, de- ren Polster sie durchspinnt und durchblüht. Juni-Juli T	-,50
- alba, die weiße Form der Felsenglockenblume T	-,50
rhomboidalis. Eine Wildglockenblume, welche bei Verwendung	,00
in stilisierter Naturnachbarschaft ihre tiefe Wirkung nicht ver-	
fehlen wird. Sie trägt den ganzen Zauber der Wegrandglocken- blume (C. rotundifolia) in den Garten, ohne wie diese zu	
wuchern. Schlanke Stiele voll feiner, blauer Glocken, ca. 50 cm,	
Juni-Juli, z. Zt. nicht lieferbar	-,-
turbinata, breite Polster aufrechter tiefvioletter Glocken, 14 Tage früher als C. carpathica	-,60
— alba, wunderschöne weiße Form der vorigen T	-,60
2. Höhere Arten •-O	
glomerata dahurica, Knäuelglockenblume. Das starke tiefe Violett	
ihrer gedrängten Blütenstände im Juni über immer breiter	
werdendem Busch ist von schwer ersetzbarer Wirkung, zumal in der Nähe des gelben Felberichs, Lysimachia velutina. Bis	
Halbschatten. 50/60 cm	-,60

latifolia macrantha, sehr große, violette, langgeröhrte Glocken,	
mit Aruncus, Aira, Lilium Hansoni, Farnen zusammensetzen.	60
Blüht ab 15. Juni, 120 cm	—,60 —,60
— alba, weißblühende Form	-,00
aber gleichwohl sehr straffe und feste Stiele, die einige große,	
zartblaue Glocken tragen. Verkörpert in sich auf das Schönste	
einen bestimmten, ebenso feinen und graziösen, wie festen und	F0
linienstarken, nicht formlos-üppigen Waldstil. Juni-Juli	—,50 —,50
— alba, weißblühende Form	,50
Carlina, Silberdistel ∞ △	
caulescens, im Spätsommer von Faltern umschwirrt. Mit Gräsern, Heide, Bergminze, Aster am. Kobold, Scutellaria canescens,	
Solidago brachyst. und Micromeria. 40 cm, ab Anfang August T	-,60
Centaurea, Bergkornblume O- montana, großblumig, blau, 60 cm, mit Anemone silvestris	-,50
	,50
Centranthus, Spornblume	
ruber coccineus, schmale Rispen, ein feines, unaufdringliches Rot, besonders für freie Pflanzungen, 90 cm, Juni	-,50
— albiflorus, siehe Neuaufnahmen	-,50
	,00
Cerastium, Hornkraut \bigcirc \triangle	
tomentosum columnae, flacher Silberteppich mit weißer Blüte,	
ist zuverlässig und zäh, hat aber den Vorteil, sich nicht wie das, außerdem wesentlich höhere, C. biebersteinii unmäßig	
auszubreiten, sondern mit allen Pflanzen des "Trockenstiles",	
zwischen die sie gehört, z. B. Gräsern, Carlina, Anemone pul- satilla, Eryngium usw. sehr verträglich zu sein. Mai/Juni, 15 cm	-,40
	,10
Ceratostigma, Bleiwurz ○ △ plumbaginoides, bildet breite Wuchsflächen mit schönem glänzen-	
dem Laub, das im Herbst rot verfärbt. Im August beginnt aus	
braunroten Knospen die enzianblaue Blüte, die sich zwischen	
den rötenden Blättern fortsetzt, 30 cm, August/September . T	-,60
Chrysanthemum, Chrysantheme, Winteraster	
1. Frühblühende Sorten, ab Ende September	
azaleanum roseum. Dieses Chrysanthemum bildet ca. 35 cm hohe,	
gut verzweigte Büsche. Blüten gefüllt, rosa, Juli-August T	-,60
— bronce, diese hellbräunliche Form ergänzt sehr schön das rosa-	co
farbene Buschchrysanthemum	-,60
indicum, Anneliese Kock, weiß	—,60 —,60
- Braune Normandie, hellbronce	,60
Normandie, die alte, edle, silberrosa Sorte	-,60
— Goldperle, klein- aber äußerst reichblühend, goldbraun, die	,
geschlossenen, gesund belaubten Büsche kommen gleichmäßig	
in Blüte. Ab Anfang Oktober, sehr lange blühend, 90 cm . T	-,60
- Kupferkastanie, leuchtend rotbraun, bestes Laub, bester	70
Stand, jahreweise früh vorblühend, wertvoll, 80 cm T — Schleswig-Holstein. Der Mangel an wirklich guten goldgelben	,70
Sorten in der Gruppe der frühblühenden, also ganz sicheren	

Chrysanth, macht diese Sorte besonders erfreulich. Ihre Her- kunft aus dem Kreis der Normandie-Sports erklärt die aus- gezeichneten Eigenschaften, 100 cm	00
koreanum, King Midas, ebenfalls sehr schön, gelbbronce, bestes	-,80
2. Mittelfrühe Sorten	,60
indicum, Granatschopf, tief granatrot	00
— Indiana, hat ein warmes, leuchtendes Samtrot, Blüten mittel-	,60
groß, gefüllt, 80 cm, September/Oktober	-,60
- Purpur, kleine, purpurrote Blüten in großer Fülle T	-,60
koreanum Nancy Coopland, samtig weinrot, halbgefüllt T	-,70
3. Späte Sorten, ab Wende Oktober-November	
kor. l'innocence, einfach zartrosa mit goldener Mitte. Versagt praktisch nie, bestes Laub, größte Kraft der mächtigen Pflan- zenstöcke. Soviel "Natur" liegt in dieser Erscheinung, daß sie auch sehr frei, mit Gräsern usw. verwendet werden kann . T	—,60
ind. Golden Rehauge, hellgoldene Knönfe über geradezu natur-	
haft schöner Staude. Blüte sehr frosthart	-,60
 Herbstrubin, kleine, tiefrubinrote Blumen T Nebelrose, silberrosa Röhrenblüten über rot verfärbendem 	-,60
Laub, darin einzigartig, ca. 110 cm	-,60
— Novemberrose, zart violettrosa	-,60
- Novembersonne, schönste goldgelbe Spätsorte! T	-,60
— Weiße Nebelrose, prachtvolle weiße Spätsorte, mit kleineren, sehr reizvollen Blumen. Sehr hart	-,60
Clematis, Alpenwaldrebe O-O \triangle	
alpina. Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen zierlichen Kleinranker (bis ca. 200 cm) durch Bergkiefern, Sträucher oder über Hänge klettern zu lassen. Nickende, blaue Glockenblüten, gelegentlich auch weiße und rosaviolette Formen, Mai-Juni. T	1,00
Cimicifuga, Silberkerze (), auch ≌	and a
acerina, aus breitflächig-glänzendgrünem Bodenlaub (30 cm) steigen völlig unbeblätterte, ganz schmale Silberkerzen auf drahtig-schlankenStielen. Höhe 90 cm. Wundervoll in lichter Streuung zwischen anderen Waldstauden. September	—,70
dahurica, echt! Keine eigentlichen Kerzen, sondern hohe, reich	
und luftig verzweigte Rispen, ähnlich einer späten, großen und ganz lockeren Spiräe. Baut sich langsam, aber nachhaltig zu stattlicher Figur aus, die dennoch von großer Zartheit der blühenden Gesamterscheinung bleibt. Äußerst wichtiger Halbschattenblüher des August, zu seinen Füßen die violettrosa Kerzenteppiche von Astilbe sin. pumila. 170 cm	1,50
japonica, Oktober-Silberkerze, in leichtem Schatten, z. B. mit	
Aconitum Wilsonae, Onoclea sensibilis, 1,70 m. Wir führen ab jetzt einen seit Jahren beobachteten ganz straffen Typ dieses herrlichen Herbstblühers, der nicht mehr wie sonst leicht einmal die Stiele durcheinander hängen läßt,sondern seine vertung der Stiele durcheinander hängen läßt, sondern seine vertung der Stiele durcheinander hängen läßt, sondern seine vertungstan Kongonstiele licht und fest über dem sehären Leube	
zweigten Kerzenstiele licht und fest über dem schönen Laube trägt	-,80

für große Pflanzungen. (Monarda)	,80
Colchicum, Herbstzeitlose O autumnale, einheimisch, Standort nicht zu trocken. September .	
Bornmülleri, zartes, helles Fliederrosa, große Blüte. September	1,00
Convallaria, Maiglöckchen () majalis, Pflanz- und Blühkeime gemischt, 10 Stück	-,60
Coreopsis, Mädchenauge (
verticillata, anspruchslose, langeblühende Kleinstaude, goldgelbe Scheibenblüten, feingeschlitztes Laub, 50 cm, mit Liatris, Anaphalis, Campanula carpathica, Potentilla. Juli-August	—,50
Corydalis, Lerchensporn O-1 \(\triangle \)	
lutea, zartblättriger, gelbblühender Dauerblüher, 30 cm, für Sonne und Schatten, Fugen, Winkel und schwierigste Plätze T	-,50
ochroleuca. Wem das Gelb der bekannten C. lutea zu derb ist, greife zu dieser sonst nicht angebotenen und doch so schönen Art. Zart sahnenweiß mit goldenem Lippenpunkt. Sie besitzt die gleichen prachtvollen Eigenschaften wie lutea, Anspruchslosigkeit, Dauerblüte usw., auch farnähnliches Laub, blüht aber schon ab Ende April und wächst eher noch üppiger. Sonnige	
und schattige Lage	,50
cava alba, der große Waldlerchensporn (Knollenpflanze), der im Frühling die Böden ganzer Wälder in violett-blühende Flächen verwandeln kann, ist für den Garten gerade in seiner weißen Form besonders anziehend. Die rahmweiße Rispe ist im Gesamtton eigenartig bestimmt durch die dunkelbräunlichen Hochblättchen, welche zwischen den Blüten sitzen. Wunderschön in halbschattigen Partien mit blauem Lungenkraut, gelben Primeln usw. Verbreitung durch Selbstaussaat. April, 25 cm	-,30
Cotula, Fiedermoos) \triangle	
squalida, flachste, bräunlichgrüne Polsterteppiche	-,40
Cotyledon (Chiastophyllum) Goldtröpfchen ○-① △ simplicifolia, über wintergrünen Rosetten (5 cm) sehr reizvolle, von 20 cm hohem Stiel linienschön überhängende gelbe Blüten- trauben. Erstaunlich unbekannt, dabei vielseitig wertvoll im Halbschatten, z. B. unersetzlich im absonnigen Steingarten, aber auch in flächiger Verwendung. Juni	—, 50
Crocus, Wildkrokus O-1 \(\triangle \)	
tommasinianus, ein schlanker, zartlilafarbener Vorfrühlings- krokus, welcher sich mit allen Kräften seiner Wildnisherkunft durch Selbstaussaat im Garten schnell heimisch macht und große Bestände bildet. Sehr früh blühend, meist schon im März Im Frühjahr nur aus Topfanzucht, 3 Stück im Ballen	-,15
herbstblühende Arten	
speciosus. Erstaunlich, wie unbekannt die "Herbstkrokusse" noch immer sind, obwohl es doch auf der Hand liegt, welche Wirkung dieses frühlingshafte Blüben in den Herbst hineinträgt	

und welche Belebungsmoglichkeiten sonst abgebluhter Partien mit ihm gegeben sind. Der Vorteil für feine Partien, die grobes Laubwerk nicht vertragen, liegt gegenüber der Herbstzeitlose in den feinen, schmalen Blättern. — Leuchtend blaue, große Kelche mit dunkler Äderung und orangefarbener Narbe. September-Oktober, zwischen Polstern und Teppichen. 10 cm Im Frühjahr nur aus Töpfen, 3 Stück im Ballen	—,15 —,50
zonatus, etwas kleiner als voriger, zart rosaviolett mit goldenem Schlundring, sehr schön und, wie auch voriger, gut ausdauernd. Häufig Selbstaussaat. — Alle Wildkrokusse gehören aber nicht in den "Rasen"	—,15 —,50
Cyclamen, Winterharte Wildalpenveilchen 🕦 🛆	
Es gibt kaum etwas Reizenderes als diese kleinen Alpenveil- chen des Waldbodens. Zu sandige, sowie nasse Böden meiden. Nordlage hoher Wände ist ungeeignet. Die Kultur ist übrigens doch viel weniger schwierig, als meist geglaubt wird.	
coum, dieses kleine, leuchtend karminrosa Alpenveilchen gehört zu den Kostbarkeiten des leidenschaftlichen Blumenliebhabers. März-April, 5 cm	,90
europaeum, das duftende, rosa blühende, heimische Wildalpen- veilchen. August, lichter Schatten	-,80
neapolitanum, schöne Zeichnung der großen Blätter. Diese ziehen im Juni ein und treiben mit der Blüte neu aus. Blüten zartrosa, August-September, z. Zt. nicht lieferbar	_,_
— album, eine Form obiger Art von reinem Weiß mit noch ausgeprägterer Silberzeichnung des Blattwerkes. Auffallend ist die besondere Starkwüchsigkeit dieser Form. Alte Knollen bringen 50 bis hundert Blüten. Sät sich in geeigneter Lage leicht aus	,80
Delphinium, Rittersporn (
hybr. Berghimmel, warm hellblau, mittelspät	1,50
— Blickfang, halbgefüllt, mittleres Blau mit Rosa	2,00
— Dein blaues Wunder, große, sehr edle Blumen von ganz warmem seidigem Blau stehen licht in wundervollen Rispen zusammen	2,00
— Enzianherold, strahlend enzianblau, weiß gesternt, schöne Ein-	
zelblume in mächtigen, gläsern durchsichtigen Rispen	2,50
— Ernst v. Borsig, wundervoll leuchtendes Mittelblau mit weißem Auge	2,00
— Finsteraarhorn, wohl unbestreitbar der Schönste in dunkel- glühendem Enzianblau, vertieft durch dunkles Auge	2,50
— Fön, tief-blauviolett, wichtig als mächtige Frühsorte	1,50
— Glescherwasser, schönste Sorte von kühlstem Hellblau	1,50
- Gute Nacht, dunkel-rötlichviolett, halbgefüllt	1,75
— Malvine, helles Silberviolett an langen Rispen von besonders guter und straffer Haltung. Macht schon die Gesamterschei- nung des Busches an sich die Sorte vor vielen anderen emp- fehlenswert, so tut dies besonders auch die weiche verträg- ten von die Weisen von die Weisen wird in der verträg-	
liche Farbe. Sie ergibt bestimmte Kompositionsmöglichkeiten mit anderen Staudenfarben, welche weder mit den scharf-	
blauen, noch den rotvioletten Sorten gelingen	2,00

— Meergott, Auffallend lange, schmale Blütenrispen von durch- sichtigem Azurblau. Hoher, sehr straffer Wuchs. Daß diese Sorte plötzlich gegen Ende der Ritterspornzeit auftaucht, macht	
sie besonders wertvoll	2,00
— Nostradamus, volle und dicht besetzte Blütenrispen von bester Haltung. Amethystviolett auf dunkelblauem Grund, halbgefüllt	2,00
— Perlmutterbaum , große, sehr schöne Blumen von seltsam intensivem Hellblau erhalten durch dunkles Auge tiefe Ausdruckskraft und bauen sich zu edlen Rispen auf. Das Blau ist	
von leichtem Rosaschein durchflogen	2,00
auch durch den nur mittelhohen Wuchs	1,50
Dunkelenzianblau dieser ganz für sich stehenden Sorte	1,50
Niedrige Sorten	
 Arnold Boecklin, zierlicher Belladonnatyp, türkischblau Gnom, hellblau, straff, nur etwa 100 cm hoch 	,80 1,50
- Rosa Überraschung, lachsrosa, locker verzweigt, auffallend	
lange Blütezeit, ca. 80 cm	1,00
Dentaria, Zahnwurz	
April-Mai. 40 cm hoch. Selten und schön. Im Spätsommer einziehend	_,70
Dianthus, Nelke 🛇 🛆	
alpestris. Es handelt sich hier um eine der schönsten und brauchbarsten Wildnelken. Sie bildet mächtige Polster in bläulichem Meergrün, welche äußerst dauerhaft sind. Die graziöse duftende rosa Blüte erscheint reich und ist wirklich schön, noch gehoben durch das Braunrot des Knospenwerkes. Daß diese Form (noch dazu eine der wenigen noch ganz echten, d. h. unbastierten Wildnelkenarten) nicht schon längst weit verbreite-	
tes Gartengut ist, kann nur an einer Verwechslung mit der heiklen, ganz andersartigen Hochgebirgsform "alpinus" liegen. 25 cm. Juni	,50
caesius compactus, dichtnadliges, niedriges Polster, große, silberrosa Blüten, 10-15 cm, Juni	-,50
— Blaureif, in der Schönheit und Uppigkeit des silberblauen Polsters liegt der große Wert dieser Sorte, Juni	,50
cruentus, auf hohem, schlankem Stiel ragt diese Wildnelke mit dem dunkelglühenden Rot ihrer Blütenköpfchen aus ihrer Umgebung wie ein Edelstein heraus. Für Stein- und Wild- gärten, 40 cm	—,50
deltoides splendens, rubinrote Heidenelke, 20 cm, Juni-Juli	-,40
neglectus, lachskarminrosa Blüten, Unterseite sandgelb, zuverlässigste der alpinen Nelken, Juni	,50
spiculifolius, Siebenbürger Federnelke, graugrüne starke Polster, weiß, duftend, 25 cm, Juni	-,50
plumarius Landpfingsten, alte, schön duftende Landsorte der Federnelke, für Einfassungen usw. Feste, kleinere Blüten, rosa	
gefüllt, guter Stand, bewährte Haltbarkeit. 25 cm, Juni	-,50

spectabilis, die bekannte schöne Staude gedeiht auch im lichten Schatten, Mai, 90 cm	70
Dictamnus, Diptam ()-()	,
fraxinella, wer diese schöne, im Alter mächtig werdende Wildstaude nicht kennt, muß sie erproben. Beschreiben läßt sich solche Eigenart nicht. Rot geäderte, weißrosa Blüten in Rispen, Laub aromatisch duftend. 100 cm, im Juni	1,00
Digitalis, Fingerhut ()	
ambigua, gelber, niedriger Staudenfingerhut mit großen Glocken.	
80 cm, Juni-Juli	—,50 —,50
gloxinaeflora, bekannter, rosa und weißer hoher Zweijahrs- Fingerhut	,30 ,40
Dodecatheon, Götterblume) \triangle	
clevelandi, rosa Alpenveilchenblüten in kleiner Dolde an feinem Stengel über flacher Blattrosette, 30 cm, Mai T	,70
meadia, in Blüte und Wuchs etwas größer als clevelandi, ca. acht Tage später erblühend	—,80
Doronicum, Gemswurz, Gelbe Frühlingsmarguerite O-	
caucasicum, goldgelb, 40 cm, April-Mai	-,50
plantagineum excelsum, großbl., goldgelb, 80 cm, Mai, Sch	
The second secon	Contract of the Contract of th
Dryas, Silberwurz ○ △ octopetala, kleinblättriger Silberwurz. Flache, immergrüne Teppiche, weiße Blüten im Mai und August. Von Campanula pusilla durchwirken lassen. Schmückender federbuschartiger Fruchtstand. 10 cm	—,80 —,70
Epimedium, Elfenblume Es gibt im lichten wie im tiefsten Schatten kaum etwas wichtigeres als diese Gattung. Der feine "Waldstil" dieser zartblühenden und schönblättrigen Wesen verbindet sich mit einer unübertreffbaren Zähigkeit und Kraft des Pflanzenstockes. April-Mai	
1. Feinwüchsige Arten mit zierlichem Laub, bis 30 cm	
macranthum, echt!, große weiße gespornte Blume	
muschianum niveum, sehr zierlich, schneeweiß	-,70
2. Stärker wachsende Arten, größeres Laub, bis 50 cm	
coccineum, rot blühend, bronceroter Austrieb	-,70
macranthum Rose Queen, große rotviolette Spornblüte pinnatum elegans. Wesentlich bei dieser starkwüchsigen Art ist	,80
das bis ins Frühjahr grün bleibende Laub. Blüten leuchtend goldgelb. 50 cm, April-Mai	— ,70

sulphureum, zart schwefelgelbe Rispen	-,70
versicolor. Wertvoll durch sein im Herbst rotbraungetöntes Laub 40 cm	-,70
Eranthis, Winterling \bigcirc \triangle	
hiemalis, die bekannte, erste Vorfrühlings-Knollenblume, oft schon Ende Februar erblühend. Große, goldgelbe Schalen über anfangs kleinen Blattschirmen und stämmig-kurzen Stielen. 5 bis 10 cm	—,15 —,50
Erigeron, Feinstrahlaster (
hybr. Sommerneuschnee, anfangs lichtweiß, mit Rosahauch verblühend. Wertvolle Sorte auch zu Rittersporn, 70 cm speciosus semiplenus nanus, zartlavendel, fast gefüllt, runder Busch von straffem Wuchs. Schön mit Oenothera glabra, 50 cm.— Wuppertal, gefüllt, großblumig, weich lavendelblau	—,60 —,60 —,60
Erodium, Reiherschnabel () \(\triangle \)	
macradenum, weißrosa, mit dunkelroter Zeichnung, 15 cm, Juli, T	-,80
Eryngium, Edeldistel ○○ hybr. Juwel, feinstrahlige, stahlblaue Edeldistel, 50 cm, Juli — Violetta, violettblau gefärbt, 50/60 cm	
Euphorbia, Wolfsmilch	
myrsinites, äußerst ornamentale, niederliegende, blaugrüne Blattzweige überdauern den Winter, Blüten gelb, Mai △ Tpolychroma, bekannte Kugelwolfsmilch, goldgrün, Mai, 60 cm.	,50 ,60
Filipendula, Königsspiräe ○-① ∞	
rubra venusta magnifica, mächtige Erscheinung mit Dolden wie eine große Mandelspiräe, warmrosa, Juli, 160 cm, in frischer Lage	— ,60
Fritillaria, Kaiserkrone O-O A	
imperialis, rotbraune Kaiserkrone der Bauerngärten, Mai, auch lichter Schatten, im Frühjahr nur mit Topfballen verpflanzbar z. Zt. nicht lieferbar.	-,-
pallidiflora, große, weichgelbe Glocken über prachtvoll bläulich- grünem Laub zu 3 bis 6 an einem Stiel. April-Mai, 50 cm. Eine Seltenheit, ganz hart und ohne Schwierigkeit. Zwiebel im Herbst 15 cm tief setzen. Im Frühjahr mit Topfballen lieferbar	1,50
Gaillardia, Kokardenblume ()	
aristata Burgunder, weinrot (Sämlingsanzucht) 50 cm, Juli/Aug. — regalis, zweifarbig, gelb und rote Königskokardenblume	
Galeobdolon, Goldnessel	
luteum florentinum, schöne silbergefleckte und großblättrige Form der Goldnessel, die bei der schnellen Bedeckung schatti- ger Bodenflächen beste Dienste leistet, Blüte gelb, Mai	-,40
Gentiana, Enzian, lehmig-humos, frische Böden \bigcirc \triangle acaulis, der tiefblaue Glockenenzian, Mai, 10 cm, versagt auf zu trockenen Böden, lehmig	—,80 —,80

asciepiadea, Schwalbenschwanzenzian, leicht geschwungene blaue	
Blumenbögen im August mit 15 bis 20 Blüten besetzt, im lich-	
ten Schatten auf kräftigen Böden leicht gedeihend. Bis 80 cm	
hoch, alte Stauden über 100 cm breit, weit über 50 Stiele. Zwi-	
schen Luzula silvatica, Epimedium und halbhohen Farnen T	-,80
Farreri, große Glocken, rein-zartblau, außen schwarzgelbe Zeich-	
nung, verlangt lehmig-humosen Boden, sonnige Lage, Aug., T	1,50
	2,00
septemfida, leicht gedeihender Sommerenzian, dichte tief-	00
blaue Blumensträuße, 20 cm, Juli-August	-,80
sine-ornata, licht-ultramarinblauer Herbstenzian, verlangt un-	
bedingt kalkfreien Boden, wo er blütenübersäte Teppiche	
bildet. Eine kleine Sonderanlage lohnt jede Mühe. Oktober T	1,20
Geranium, Storchschnabel O	
lancastriense, große, hellrosa Blüten über feinem, flachstem	
Laubwerk, anspruchslos, 10 cm, Mai/Juni, \triangle T	-,60
	-,00
ibericum platypetalum, großer, blauer Storchschnabel, vielfältige	
Verwendungsmöglichkeit, gerade für freie Pflanzung, aber	
auch gartenhaft prachtvoll mit Taglilie. Erblüht mit Feuer-	
mohn. Juni. Herbstfärbung!	-,60
sanguineum. Der bekannte Blutstorchschnabel ist nicht zu ent-	
believe Die Delange heut gieb in I-wäftigen Däden im Verlauf	
behren. Die Pflanze baut sich in kräftigen Böden im Verlauf	
einiger Jahre zu üppigen, runden Büschen auf, die von Mai-	
ende bis Juli mit ansehnlichen, karminvioletten Blumen be-	
steckt sind. Bis 60 cm. Sonne bis trockener Halbschatten. Mit	
Gräsern und anderen Wildstauden. Im Herbst oft blutrote	
Laubfärbung	-,60
- album, schöne schneeweiße Form. Mit voriger zusammen ver-	
wenden	-,60
Wenden	,,,,
Geum, Erdwurz 🔾	
Borisii hort., brennend orangerot, 40 cm, April/Mai, A	-,50
	,50
hybr. Prinzeß Juliana, wichtige Kleinstaude der Junirabatten.	
Hellorange, 60 cm, Mai/Juni	-,70
Globularia, Kugelblume () (\Delta)	
pygmaea, flachster, tief-immergrüner Teppich, blau, Juni	-,50
Gypsophila, Schleierkraut ()	
hybr. Rosenschleier, zartrosa, gefüllt, breite niedrige Schleier-	
massen, 40 cm, Juli, Treppen und Mauern überwallend △	-,60
paniculata fl. pleno, weiße luftige Schleier von großer Schön-	
heit im Juli, 90 cm, luftiger, schöner, gleichmäßiger Busch,	
bis August	1,20
repens rosea, ganz niedrige Teppiche, Mai/Juni, 5 cm, 🛆 T	-,50
- monstrosa, 50 cm hohe weiße Schleier im Juni, auch zur Über-	
	-,50
pflanzung von Zwiebelgewächsen	-,00
Haberlea (Gesneriaceae) ()	
Ferdinandi-Coburgi. Eine kostbare Seltenheit für Steingärten,	
Presumanui-Coourgi. Eine kostbare Seitenmen für Steingarten,	
Mauern usw. in absonniger Lage, besonders in den boden-	
anliegenden, wintergrünen Laubrosetten, Ramondia ähnlich.	
Die violetten Blüten aber röhrig, fast wie eine kleine Gloxinie.	
Mai–Juni. Verwendung und Ansprüche wie Ramondia T	1,20
Hedreanthus, Krugglocke () ()	_,_
Hedreanthus, Krugglocke ○ △ dalmaticus, tiefviolette Glocken in Büscheln, 5 cm, Juni T	

I Frunsorten, Niedrige Gruppe, ab erste Julitage	
hybr. Crimson Beauty, goldlackrotes Zwerghelenium, 60 cm, dichte Farbenmassen. (Anaphalis, blauer Salbei, Leucanthemum, Avena)	-,60
- Moerheim Beauty, leuchtendes Samtrot, 100 cm, wertvoll	-,70
— pumilum magnificum, rein-sonnengelb, 80 cm, reichblühend.	-,50
- Windley, bräunliches Bernsteingold, straff gebaut, 100 cm	-,60
Windley, braumenes bernsteingold, strait gebaut, 100 cm	-,00
2. Mittlere Zeitgruppe, August	
— Braungold, goldgerändertes Rot mit dunklem Knopf, 1 m	,80
— Goldfuchs , große Blüten von golddurchflossenem Rot, üppige Blütenfülle, stämmiger Busch, ca. 1,50 m	-,70
— Goldlackzwerg. Ein stämmiges nur 90 cm hohes Helenium von schönstem Rotbraun, erste August-Hälfte erblühend. Da- mit dürfte auch ohne viele Worte die Wichtigkeit dieser Foer- ster-Sorte klar sein	1,00
	1,00
— Kastania (Karl Foerster) Samtrot, breite, feste Büsche von ca. 130 cm Höhe. Ab Anfang August. Sehr schön!	,80
3. Gruppe, etwa ab Mitte August bis September	
- Gartensonne, zitronengelb mit braunem Knopf, 170 cm	-,50
 Kupfersprudel, der 160 cm hohe, sich sehr gut tragende Busch ist wegen seiner auffallend langen Blütendauer von hohem 	
Wert. Brauner und roter Blütenreichtum, AugSeptember .	,80
— Rubinkuppel, eine neuere Heleniumsorte aus der großen Zahl der Foerster'schen Züchtungen. Im August erblühend, bis in den September hinein. Etwa 1,50 m hoch, von einer tief samt- roten Farbe, wie es sie bei den späten, hohen Helenium- sorten bisher nicht gab	1,
	1,
— Sonnenberg , etwas früher und gedrungener und in der Farbe satter als Gartensonne, bildet eine fast kugelrunde Blütenkuppel, 140 cm	—,80
delianthemum, Sonnenröschen ○ △	
alpestre, zitronengelbes Zwergsonnenröschen, kaum 10 cm, immergrün, Mai-Juni	,60
Die folgenden Gartenformen bilden bis 30 cm hohe und etwa 50 cm breite Büsche.	
amabile Rubin, gefüllte, tiefrote Blumen	,50
— Gelbe Perle, zartgelb, gefüllt. Die gefüllten Blumen sind besonders haltbar	— ,50
hybr. Golden Queen, die beste der leuchtend Goldgelben T	-,50
— Orange Queen, bräunliches Orangerot über silbergrauen Laubpolstern	-,50
	,50
— Lawrenson's Pink, lachsrosa, reichblühend	,50
hyssenifolium warmes Rot gedrungener Rusch T	- 50

Helianthus, Stauden-Sonnenblume ()	
multiflorus Meteor, schönbelaubte, festgebaute Büsche, 140 cm, große Blüten von vollkommener Form und Ausdruckskraft, lichtgelb. (Aconitum nap. Spark's Var., Helenium Goldfuchs). Bei harten Kahlfrösten etwas Winterschutz	
Heliopsis, Sonnenauge	
Wertvollste Neuzüchtungen von Karl Foerster, erblühen ab Anfang Juli. Zusammenstellung mit: Salbei, Leucanthemum max., rotbraunem Helenium, blauem Delphinium u. a.	
hybr. Goldgrünherz, dichtgefüllte zinnienhafte Blüten in tiefem Zitronengelb mit grünem Herz, straff gebaut, ungeheuer reich- blühend, 130 cm, Juli/August	—,80
— Goldgefieder, besonders große Blüten, mittleres Goldgelb, ge-	-,00
füllt und rund gewölbt, fester, runder Bau v. 120 cm, Juli-Aug. — Sommersonne, große goldgelbe Blumen auf straffen Stielen.	1,20
Juli-August, 150 cm, halbgefüllt	-,80
 Spitzentänzerin, einfache edle Blumen von schönem Schwung der Blütenblätter und tiefem Orangegold, ca. 100 cm, Juli/Aug. 	-,80
Helleborus, Schneerose (Christrose) 1	
hybridus, rote Farben, mächtige Büsche schön geschnittener, wintergrüner Blätter. Die etwas glockigen Blüten spielen in dumpfen tiefen Rots, von mehr bräunlicher oder violetter Tönung. Verträgt nach gutem Einwurzeln mehr Sonne als H.niger. Bis 60/80 cm. Wichtiger Farbträger unter den Vor-	
frühlingsblühern, März-April, z. B. am Gehölzrand mit brau-	
nem Fallaub und Schneeglöckchen	1,20
niger grdfl., die bekannte Schneerose in großblütiger Form, im März blühend, lichter Schatten	1,20
— maximus, diese schöne, außerordentlich großblumige, reinweiße Sorte beginnt mit der Blüte im Februar	1,50
— praecox, blüht ab Ende Oktober bis in den Dez. Zwischen spätherbstlichen Bodenfarben und wintergrünen Tönen: Epimedium, Tiarella, Luzula silv., im lichten Schatten.	1,50
Hemerocallis, Taglilie O-()	phone:
1. Frühblühende Sorten ab Ende Mai	
graminea. Diese Zwergtaglilie kann bei phantasievoller Verwendung eine wichtige Rolle spielen. Grasartige Büsche von 40 cm Höhe mit reizvollen, hellgelben Trichterglocken, ab	
Ende Mai/Anfang Juni	,80
hybr. Apricot, aprikosengelbe Massenblüte, 70 cm	-,60
— Aureole, sattgoldgelbe, schnittige Blüten, 70 cm — Sovereign, edle Glockenform, hellgolden, außen bräunlich	,60 ,70
	-,10
2. Sommerblühende Sorten	
eitrina Baronii, hellwachsgelb, von höchster Rassigkeit der langen schmalen Trichterglocken	1,00
luteola major, hellgelb, vollere Glockenform, über mächtigen,	
schön getragenen Gräserbüschen, 120 cm	,70
triloba, das tiefblaue, einheimische Leberblümchen, Halbschatten, mit der echten Wild-Kissenprimel, Pr. vulg., März-April	,50
The state of the s	

— rubra plena, seltene, gefüllte, rote Form	1,00
— alba, auch das weiße Leberblümchen belebt reizvoll kleine Schattenwinkel, z. Zt. nicht lieferbar	-,
Heuchera, Purpurglöckchen ○-① △	
sanguinea Feuerregen, bis 50 cm hoch steigen glühendrote Rispen kleiner Glöckchen aus wintergrünem Laub, Juni-Juli	,60
Hieracium, Habichtskraut 🔘 🛆	
rubrum, wird nicht, wie aurantiacum, durch Selbstaussaat lästig; leuchtend rotbraun, Wuchs flach, Blütenstiel 20 cm hoch, Mai-Juni, zweite Blüte im September. (Polstergarben, Campanula, Hypericum polyph.)	— ,50
Hosta, Funkie O-O-O	
coerulea minor (lancif. tardiflora) eine grün- und sehr feinblätt- rige Form, reichster Flor schlanker, zartvioletter Glockenris- pen im August, Blütenschaft 70 cm	-,60
Fortunei robusta, da unsere Bestände in der echten H. Sieboldii zu stark erschöpft sind, bieten wir vorläufig die sehr ähnliche, ebenfalls blau- und großblättrige "Fortunei" an	,80
Hutschinsia auerswaldii, siehe Neuaufnahmen	-,60
Hypericum, Johanniskraut ()-()	
calycinum, eine der schönsten Schattenpflanzen, wintergrün- broncierendes Laub, darüber, fast unglaubhaft, die 7 cm mes- senden, goldgelben Blütenschalen, geziert durch die über- reichen Staubfäden, starkwachsend, 40 cm, Juli-August T	—,70
olympicum, zierliche Form der sonnigen Lagen, mit Wildnelken, Glockenblume, Thymian, Katzenpfötchen, Sedumarten und Veronica, 25 cm, Juni-Juli △	,50
polyphyllum, zierlicher als olympicum, nur 12 cm 🛆	,50
Iberis, Schleifenblume ○ △	
sempervirens Schneeflocke, blendendweiß, mit den Jahren breite Büsche bildend, 30 cm, April/Mai, wintergrün	,50
Incarvillea, Staudengloxinie 🔾 🛆	
Pelavayi, große, warmrosa Trompetenblumen, Blütenschaft 70 cm hoch, Blattwerk 25 cm, Juni brevipes, wie vorige, jedoch 40 cm hoch	
Inula, Alant () (
ensifolia, goldgelbe, schöne Korbblüte, geschlossener, runder Busch, 30 cm, Juli-August	-,50
Iris, Schwertlilie ()	
1. Zwergschwertlilien, April-Mai △	
pumila aurea, goldgelb, 20 cm	,50
 coerulea, hellphosphorblau, 15 cm, früheste der Gruppe cyanea, dunkelviolett, sehr gut wüchsig, 20 cm 	

reticulata, J. S. Dijt, Zwiebeliris, März-April, 15 cm, rötlich-	
purpurn	-,30
im Frunjani 3 Zwiebem im Topipanen	1,00
2. Hohe Schwertlilien ab Ende Mai	
D = Domblätter, H = Hängeblätter	
germanica	
— Eckesachs, sehr großblumig, D zartlavendel, H veilchenblau.	-,60
- Flammenschwert, D. gelb, H. samtig rotbraun mit schöner	
weißer Äderung, ca. 80 cm	,70
- G. P. Baker. Eine klargelbe, hohe und weithin wirksame Sorte,	
die uns auch gerade durch ihre Reichblütigkeit und starken Wuchs wichtig scheint	90
- Goldcrest, einfarbig, intensiv-blau, goldener Bart	-,80
	,80
- Lenzschnee, D lichtes Weiß, H zart porzellanblau	-,80
— Maori King, D sattgelb, H samtbraun mit gelbem Rand, 35 cm	-,50
— Marco Polo, Braunrot, sehr großblumig	2,00
- Odenvogel, zitronengelb, H violett-rotbraun mit gelbem	
Saum, 80 cm	-,60
- Pink Satin, große, sehr vollkommene Blumen von geschlosse-	
nem Dom und edel getragenen Hängeblättern. Das Ganze ein-	1.00
farbig — aus schönster zart malvenrosa Seide	1,20
— Rheingauperle, lilarosa	-,80
— Rheinnixe, D weiß, H violett, reichblühend, 90 cm	-,60
- Rheintraube, D lavendelblau, H dunkelviolett, 90 cm	-,70
Riese von Könnern, Blüten groß, einfarbig, lavendelblau	-,60
- Souvenir de Mme. Gaudichau, in sattem, tiefem Violett im-	
mer noch eine der Bewährtesten, reichblütig, 1 m	-,80
— Wedgewood, mittelblau	-,80
- White Knight, alabasterweiß, 60 cm	-,70
为 是一种的现在分词,但是一种的一种的一种的一种的一种。	
3. Gräser-Iris, Blütezeit Juni-Juli	
orientalis Snow Queen, Weiß mit goldener Zunge, 80 cm	60
	-,60
sanguinea, Blüte von unglaublich edel geschnittener Form, samtig violett mit gelber Zunge, 120 cm	-,60
sibirica, Strandperle, weich-hellblau, sehr reichblühend	,60
	STATE OF THE PARTY OF
— superba, niedriger als vorige, tiefblau, 80 cm	-,60
wilsonae, siehe Neuaufnahmen	-,70
sopyrum, Muschelblümchen 🕦 🛆	
thalictroides, überaus zierliche Schattenpflanze, anemonenähn-	
liche, weiße Blüten, frischgrünes Laub, April-Mai, das Laub	
stirbt bald nach der Blüte ab	-,60
effersonia, Herzblattschale () 🛆	
diphylla, sehr seltene Schattenpflanze, weiße Blüten über bron-	
cegetönten Blättern, 20 cm, April-Mai	1,50
dubia, unglaubhaft zarte Erscheinung, sowohl in ihren lichtblauen	
Blüten, als auch in ihrem, beim Austrieb verschiedenfarbigen,	
zarten Laub. Trotz ihrer Schönheit unbekannt, April-Mai,	1.50
15 cm, Humus!	1,50

Kirengeshoma, Wachsglocke	
palmata, der mittelgroß-blättrige Laubbusch liebt lichten Schatten, und wird ca. 80 cm hoch, im Alter über 100 cm breit und wirkungsvoll. Die glockenähnlichen Blüten sind sattgelb und wachsartig. Juli-August	1,00
Lavandula, Lavendel OO	
vera, silbergraue Büsche, blaue Blütenähren. Der kleine Duft- strauch verträgt Rückschnitt im Frühjahr, 60 cm, Juli T	— ,50
Leontopodium, Edelweiß 🔿 🛆	
alpinum, silberweiße Blüten und Blätter, durch reichliche Dunggabe wird die Pflanze grünlich. Kalkliebend, Juni-Juli	-,50
Leucanthemum, Staudenmarguerite (
maximum Gruppenstolz, große Blüten, nur 50 cm, straff, Juli .	-,60
— Phänomen, sehr große, herrliche Blumen, bis 100 cm, Juli	-,70
vulgaris, Wunderkind, kremeweiß, gefüllt, 70 cm	-,50
Liatris, Prachtscharte ○ △ spicata, straffe, rotviolette Blütenkerzen, auffallend von Schmetterlingen besucht, anspruchslos, August, 40 bis 50 cm	,60
Lilium, Lilie O-() Die Lilien lieben eine Umpflanzung, je sonniger sie stehen, desto ausgesprochener; dadurch gleichmäßige Frische und Kühle des Bodens. Nasse Böden meiden, zumeist etwas beschattete Lage; erdig-verrotteter Dung	
1. Türkenbundformen, hängende Glocke, zurückgerollte Blütenblätter	
Hansoni, Goldwachslilie, bis 100 cm hoch, Juli, haltbar Martagon, einheimischer Türkenbund, purpurbraun, Juli 80 cm	2,50 1,20
speciosum rubrum, große, edle Blumen,, weißrosa, rubin ge- fleckt, 70 cm, August-September	150
testaceum, Isabellenlilie, nankinggelb, bis 150 cm, Juli	1,50 3,00
tigrinum, Tigerlilie, orangefarben, braun gefleckt, Juli-August, 120 cm	
2. Trompeten- und Schalenlilien	
candidum, Madonnenlilie, reinweiß, 120 cm, Juni-Juli	1,00
regale, Königslilie, großglockig, weiß, Schlund gelb getönt, 100 cm Juli	1,00
umbellatum, die bekannte Feuerlilie der Bauerngärten. Orangerot. Juni	1,00
— erectum, eine alte, sehr eindrucksvolle Form der Feuerlilie, deren erste Blumen an einem höhergebauten Kerzenstand von Knospen erblühen, was der Erscheinung für unser Empfinden etwas Festliches verleiht. Gelblich-Orange. Juni, z. B. mit lavendelviolettem Erigeron und silberweißem Hornkraut äußerst schön. ca. 80 cm.	1,20
Linnaria, Leinkraut O 🛆	
pallida. Hellviolette "Löwenmäulchen"-Blüten auf ganz niedrigen, schnell in die Breite kriechenden Polstern. 5 bis 10 cm.	E0

Linum, Staudenlein O	
flavum, helles Goldgelb, kleiner 30 cm hoher Busch, wertvoll be- sonders im Steingarten und in freien Anlagen, Juli	-,60
perenne, auf feinen, vom leisesten Wind bewegten Stielen sitzen schwebend seidigblaue Blüten, 50 cm. Erhält sich leicht durch Selbstaussaat. Juni-Juli	-,40
Lithospermum, Steinsame ()-()	
purpureo-coeruleum, enzianblaue Blüten, schmales Laub, wur-	
zelnde Ranken, ausgezeichnet für Bodenbedeckung, 30 cm, April-Mai	,50
Lotus, Hornklee \bigcirc \triangle	
corniculatus fl. pl., eine gefüllte Form des rotknospigen, in der Blüte goldgelben Hornklees, der mit seinen unverwüstlichen, breiten und dichtgrünen Polsterdecken wertvolle Dienste leistet. Ein robuster Flächenbewältiger für sonnige Pflanzungen, in denen mittelhohe Stauden mit unempfindlichem Bodenwuchs verbunden werden sollen. Juni	—,50
Lupinus, Staudenlupine ()	
polyphyllus Ada, helles, weiches Gelb, straffe Blütenkerzen, lange Blütendauer, Juni, 100 cm, wichtige Spätsorte	,80
— Black Knight. Dunkelstes Samtviolett, in der Ferne fast schwarzblau wirkend, füllige Ähren, 100 cm, Mai-Juni	1,20
— Countes of March, porzellanweiß mit Lila, lange Blütenähren,	1,20
bis zum Verblühen wirkungsvoll, 120 cm hoch, Mai-Juni	1,20
— Downers Delight, warm und tiefrosa mit weißem Schiff, 5/6.	-,80
— Moerheims Rood. Die erste rote Sorte, welche nicht ins Bläuliche spielt, sondern sogar einen Kupferton zeigt. Eine starke,	
eigenartige Farbe. Mai/Juni	1,50
 Mrs. John Harkneß. Vollständig reines, auch sauber verblü- hendes Hellgelb. Lange gute Rispen. Dazu starker Wuchs und 	
gute Winterhärte. Eine der idealen Sorten in Gelb. Mai/Juni	1,00
— Nicol Walker, lichtes, zartrosa getöntes Gelb, 120 cm, Mai/Juni	,80
— Riverslea, vertritt mit besten Eigenschaften die alte, seiner-	,,,,,
zeit gute, rote "Fanfare", Mai/Juni	-,80
- Sax Blue, gutes, ausdrucksvolles Blau, schlanke Ähren, 120	
cm, Mai/Juni	-,80
- Sunset Glow, gelb-orangerosa, weinrot dunkelnd, 120 cm,	
Mai/Juni	-,80
Lychnis, Brennende Liebe (
chalcedonica. Das Zinnoberrot der Blütendolden überrascht	
immer wieder. Schön vor Fichten und dunklen Laubwänden,	-
100 cm, Juli	-,60
Lysichitum, Scheincalla ○-① ≅	
americanum. Eindrucksvolle Sumpfstaude für feuchte Lagen. Mächtige calla-artige Blüten vor Laubaustrieb, hellgelb. April. 40—50 cm	2,00
Lysimachia, Felberich O-()	
clethroides, Wildstaude von höchstem Reiz und höchster Brauchbarkeit, da sie ihren Flor leicht gebogener, fester weißer Ker-	
zen gerade in licht beschatteten Lagen am wirkungsvollsten entfaltet, — zu einer Zeit, in der dort ähnliches nicht vor- handen ist. Juli-August, 90 cm	90
Handen Ist. Juli-August, 30 cm	,80

numularia, "Piennigkraut. Reizender, flachster Bouelberan-	
ker, auch für halbschattige Stellen, mit gelben, halbglockigen	
Sternblüten. Nicht zu dürr-heiße Lagen! Zwischen Gräsern, Mimulus, Weiderich, Trollius, Sumpfvergißmeinnicht usw.	
Mai-Juni	-,50
Widi-Juli	,,,,,
velutina. Andersartiger Felberich. Gelbe Rispen, die Blüten in	
den Blattachsen angeordnet. Stärkste, langandauernde Wir-	-,70
kung in Sonne und Schatten. Juni/Juli, 70 cm	-,10
Lythrum, Weiderich (
virgatum Rose Queen, während acht Wochen leuchten die rosen-	
roten Blütenähren; trotz seiner straffen Haltung von ausge-	
sprochen lichter Bewegtheit, wuchert niemals, keine Selbst-	
aussaat. 80 cm, Juli-August	-,60
aussaat. ou ciii, Juii-August	,00
Macleya, Federmohn (
cordata Coral Plume. Diese herrliche Schmuckstaude ist auf	
Grund ihrer Höhe und des in besonders zusagenden Böden oft	
gewaltigen Umfanges nur begrenzt anwendbar, verliert aber	
dadurch nichts von ihrer großen, schönheitlichen Bedeutung	
für klug gewählte Sonderplätze. Über großem, sehr ornamen-	
talem Blattwerk von schöner bläulicher Färbung hohe bräun-	
lichrosa Federrispen, bis 2,50 m. Juli-August. Einzelstellung	
an unbeengtem Platz, aber auch beste Möglichkeit, ungute	
Stellen, wie Kompostplätze und ähnliche Ecken, liebenswürdig	
aus der Sicht verschwinden zu lassen	-,80
Micromeria \otimes \triangle	
croatica. Ein dem Thymian ähnliches, graugrünes Büschchen, 10	
cm, violettrosa Lippenblüten, Juli-August, feinster Natur-	*
gartenstil	-,50
	00
Mimulus hybr. Scarlet Bee, siehe Neuaufnahmen	,60
Moltkia () (
petraea. Ein kleiner Felsenstrauch mit coerulinblauen Blüten-	
trauben, nur 20 cm hoch, Juni-Juli	1,20
trauben, nur 20 cm noch, sum-sun	1,20
Monarda, Indianernessel ()	
didyma Cambridge Scarlet, in dichten Kränzen stehen die schar-	
lachroten Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander;	
eine würzig duftende Schattenstaude, 80 cm, Juli-August	-,60
cine warms darvende sometiment, to only our rangues .	
Myosothis, Staudenvergißmeinnicht ○ ≥	
palustris Thüringen, eine großblumige Sorte des wilden, himmel-	
blauen Sumpfyergißmeinnichts. Für recht frische Böden mit	
anderen Pflanzen des "Ufercharakters". Ab Ende Mai sehr	
lange blühend. Ca. 50 cm	,50
Nepeta, Silberminze, Katzenminze ○ △	
mussini, blaue Lippenblüten, frisch-silbergraues Laub. Von un-	
geheurem Blütenreichtum, bezaubernd durch die flimmernde	
Wirkung, die von der Zierlichkeit ihrer Rispen und des silber-	
grauen Laubes ausgeht. 40 cm, auch für Einfassungen, 5/6.	
- superba, größerblütig, gröber im Laub	-,40
[4] [2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4	
Oenothera, Nachtkerze O A	
glabra, Laub bräunlich, lackrote Knospen, goldgelbe Blüten, Juni-	- 00
Juli, 50 cm. wichtige Kleinstaude	-,60

Spätherbst, 60 cm lange, niederliegende Triebe. Wichtig für Mauern und Treppen, Juni-Oktober	-,60
Omphalodes, Gedenkemein ()—() cappadocica, leuchtende, lichtblaue Blüten, ein reizender Frühlingsblüher, der mit anderen Frühlingsblumen des Halbschattens zusammengepflanzt werden sollte. Rankt nicht wie "verna", sondern bildet sehr reichblühende, feste, kleine Büsche, 20 cm, Mai. Verträgt auch Sonne	—,50 —,40
	-,10
Origanum, Heidegünsel ○ △ officinarum compactum, stark duftender Kugelbusch, 30 cm, rosa Lippenblüten, Bienenfutterpflanze, Juli-August	,40
Orobus vernus roseus, siehe Neuaufnahmen	-,80
Pachysandra, Wolfsmilchgewächs → ∞	
terminalis, wintergrüner Bodenbedecker, am schönsten in schattiger Lage, auf frischbleibenden Böden, 30 cm	-,60
Paeonia, Pfingstrose () Die ungefüllten Pfingstrosen blühen mit großen Blütenschalen, geschmückt mit einem Kranz goldener Staubfäden.	
1. Maigruppe	
officinalis rubra plena, die alte, dunkelrote Bauernrose tenuifolia, Wildform, Laub feingeschlitzt, Blüten einfach rot	1,25 1,50 1,50
2. Junigruppe. Einfach blühende Sorten	
albiflora Angelica Kauffmann, reinweiß	1 50
- Moritz v. Schwindt, stark karminrosa	1,50 1,50
- Hans Thoma, seidenrosa	1,50
Gefüllt blühende Sorten	
— festiva maxima, reinweiß mit rotem Fleck	1,50
— Martin Cahuzac, dunkelstes Rot mit Seidenglanz	2,00
 Mons. Charles Lévêque, edelstes Zartlachsrosa, Duft! Pierre Dessert, satt karminrot 	1,50 1,50
— St. Goar, zart-fleischfarben mit lila Hauch, Schale silberrosa.	1,50
— Straßburg, großblumig, hellilarosa	1,50
— Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa, spät! Zum Gedeihen verlangen die Paeonien im Frühjahr flüssige Dunggaben. Bei großer Trockenheit ist Wässerung nötig. Die Pflanze mit Dung umlegen. Vollsonnig, Boden lehmig	1,50
Papaver, Mohn (
nudicaule, Islandmohn, zumeist nur zweijährig, sät sich selber aus. Weiß, gelb, orange, Juni-Juli △	-,40
orientale, Feuermohn	-
- Colonel Bowles, brennendrot, nicht fallend, 100 cm, Juni	-,60

— Marcus Perry, eine neue Sorte des Feuermohnes, welche über-	
raschend große, brennendorangerote Schalen auf recht starken Stielen trägt. Juni. 80 bis 100 cm	-,90
— Peter Pan, flammend rot, feste starre Stiele, nur etwa 35 cm	-,60
- Württembergia, die größten tiefblutroten Blüten, obwohl nicht	,00
immer aufrecht stehend, in Farbe und Blüte unerreicht	-,60
Paradisea, Graslilie O-O	
liliastrum major, große, weiße, lilienblütige Glocken, Juni, 50 cm	-,80
Paronychia, Mauerraute O A	
serpyllifolia, flachster und feinstblättriger Grünteppich von leicht grauem oder silbrigem Ton, der — in nicht zu großer Ausdehnung — als Möglichkeit ganz ruhiger, stiller und doch lebendig wirkender Flächen im Rahmen bewegter, natürlicher Pflanzungen sehr wichtig ist. Unnachahmlich, wie er im Steingarten im Lauf der Jahre große Blöcke mit einem geschmeidehaft feinen, dabei völlig dichten Gewebe überzieht. Muß erst tief einwurzeln, ehe er in die Breite geht. Durch Jahrzehnte ausdauernd	-,50
Penstemon, Bartfaden ()	
barbatus Hybriden, Blüten hellrosa bis dunkelrot, Rispen 70 cm	
hoch, Juli-August	-,50
Phlox, Flammenblume	
1. Frühjahrsblüher, Polsterphlox, Mai △	
setacea atropurpurea, pupurrot, 15 cm	-,50
- G. F. Wilson, sehr helles Violett, starkwüchsig	,50
— Brightness, ein frisches Rosa, selbst in großen Flächen ohne Aufdringlichkeit, wüchsig, 20 cm	-,50
— Maischnee, bildet flache, leuchtend weiße Teppiche	
— Leuchtstern, zartrosa Polsterzwerg, besonders schön als Einzelpflanze an Sonderplätzen	,60
2. Halbhoher Frühsommerphlox, Juni-Juli	
Arendsii Emmy, lockerer Wuchs, hellila Blüten, auffallend lange	
Blütedauer, unentbehrlich, 70 cm	-,60
3. Hoher Staudenphlox, Juli-August	
paniculata Aida, purpurrot, etwa 60 cm	-,60
— Campbell, reines, zartestes Lachsrosa	
— Eva Foerster, feurig lachsrosa, weißer Spiegel	
- Fanal, leuchtendstes Dunkelrot	—,80
— Frauenlob, sehr reines Chamoisrosa mit feinem rotem Auge. Zweifellos eine unserer besten, neuen Phloxsorten überhaupt in seiner prachtvoll lichten, warmen Farbe, — an ebenso elegant, wie zäh gebauten, äußerst gesunden Büschen. Die Wuchsart der mit leichtem Schwung nach außen gewendeten, verhältnismäßig feinen, dabei federnd festen, völlig standsicheren Stiele, an denen große Blütendolden schon in leichter Luftbewegung sich rühren, deutet ausdrucksmäßig fast eine neue Phlox-	-,80
"Rasse" an	,00

- Frau Anton Buchner, hoher, reinweißer Phlox	-,60
- Glut. Ein tiefes dunkles Karminrot mit leichtem Orange-	,
schmelz. Neben dem immer noch unübertroffenen "Schlageter"	
schätzen wir diese Schöllhammer'sche Neuzüchtung als besten,	
z. Zt. kultivierten, roten Phlox ein, — wobei wir natürlich von der ganz andersartigen Klasse der eigentlich orangeroten	
Phloxe absehen. Ca. 1 m	1,00
— Graf Zeppelin, weiß, rot geäugt	-,60
- Kesselring, stark violett, weiß gesternt	-,60
— Landhochzeit, starke, schön gebaute Erscheinung, rotgeäug-	
tes helles Lachsrosa	-,80
- Lavendelwolke, zart lilaweiß getönte, große Blütendolden,	
hoher und starker Wuchs	,80
- Le Mahdi, satt violett, alte, gute Sorte, vollbuschig	-,60
- Frau Alfred v. Mauthner. Hier haben wir die z. Zt. wohl	
schönste Sorte in hellem Orangerot von brennender Fern-	-,80
wirkung	—,70
— Rosabella, hellstes Silberrosa, große Dauerschönheit	60
Leo Schlageter, schönes Rot von milder, tiefer Leuchtkraft	,80
— Schneerausch, vor wenigen Jahren von Karl Foerster heraus-	,,,,,
gebracht, hat sich diese schneeweisse, starkwüchsige Sorte	
mit ihren großen Blumen und Dolden schnell im Sortiment	
durchgesetzt. Bis 1,20 m	1,00
— Sommerkleid, weiß mit duftig rosenrotem Auge	,60
- Sternhimmel, hellila, ein großer, noch nicht genügend erkann-	
ter Wert. Seine Wuchsleistung und Gesundheit ist hier unvergleichlich. Die herrliche Wirkung der im aufgeblühten Zustand	
silbrigvioletten Büsche, — etwa vor kupfer- und samtroten	
Heleniumfarben — ist nicht trennbar von der üppigen Fülle,	
in der sich die Farbe darstellt. Der Durchmesser einer Versuchspflanze betrug hier im 3. Jahr schon 1,20 m, im fünften	
Jahr 1,50 m!	-,80
— Württembergia, leuchtendes Karminrosa, niedrig	-,60
Herbstsorten, Mitte August erblühend	
— Erntefeuer, feurigrosa, rotes Auge, hoch wachsend	-,60
— Septemberschnee, lichtes Weiß, zart lila geäugt	
— Wiking, König der Herbstphloxe, warmes Rosa, hoher Wuchs	-,70
Podophyllum, Maiapfel ()	
Emodi majus, wertvolle Schattenstaude, weißrosa "Apfelblüten"	
im Mai, eigroße leuchtendrote Früchte im Herbst, 80 cm	1,00
peltatum, eine andere Art, die in der Blüte zwar etwas kleiner ist als "emodi", aber dennoch als Blattstaude des Schattens	
sehr wertvoll, da sie mit Rhizomen um sich greift (ungefähr-	
lich!) und dergestalt ganze Bestände ihres starken, schönen	
Laubes bildet. 50 cm, Frucht gelb	1,00
Platycodon, Ballonglocke (
grandiflorum Mariesii, die ballonartigen, großen Knospen öff-	
nen sich zu gesternten Schalen. Das Blau der Blüte ist trotz In-	
tensität weich. Höhe 50 cm, treibt erst Mitte Mai aus, deshalb	-,60
Standort bezeichnen. Juli-August	,00

— album, weiße Form voriger	,60
Polemonium, Himmelsleiter (
Richardsonii, leuchtend hellblaue Blüten, feingefiedertes Laub, reizende Kleinstaude, 40 cm, Mai/Juni	,50
Polygonatum, Salomonssiegel () multiflorum, weiß-grüne Blüten hängen unter leicht übergeneigten Blattwedeln, 60 cm, Mai-Juni. Schmuck der schwarzblauen Beeren im Herbst	— ,50
Polygonum, Teppichknöterich 🔾 🛆	
affine, Blütenkerzen 25 cm hoch, dunkelrosa, Juli-Sept., das Laub verfärbt im Herbst kupferrot, Farbenklang bis in das Frühjahr	—,50 —,60
Potentilla, Fingerkraut () (Siehe auch Zwerggehölze)	
1. Niedrige Arten	
aurea, warm goldgelbe Blüten, gedrungenes Laubpolst., Mai-Juni cinerea, silbergrauer Laubteppich, Blüten hellgelb, 5 cm, trok-	
kene Lage, April	,50
2. Mittelhohe Arten, wichtige Sommerblüher	
 atrosanguinea Gibsons Scarlet, blendendes, warmes Scharlachrot, eine sehr seltene Farbe! 40 cm, Juli-August nepalensis Miß Willmott, karminrosa, dunkle Mitte, Juni-Aug. — roxanae, orangerosa mit dunkelrotem Auge, 30 cm, Juni-Aug. warrensis, auffallend leuchtendes Zitronengelb, 40 cm, wie vorige Dauerblüher. Juni-August	
Primula, Primeln	
1. alpine Arten, Mai, Böden etwas lehmig, 🔾 bis absonnig	
auricula alpina, echte Wildaurikel, hellgelb, duftend T clusiana, große, lilarosa Blüten, nur 6 cm	
2. Niedrige Frühlingsprimeln ()	
acaulis (vulgaris). Die echte schwefelgelbe Wildkissenprimel, welche mit ihren quellenden Blütenpolstern vom frühen März an eine unersetzliche Rolle im Vorfrühlingsgarten spielt. Mit blauen Leberblümchen	—,50 —,40
— coerulea, diese samt- bis schieferblauen Kissenprimeln sind sehr begehrt und in guter Qualität selten. Wenn auch bei ho- hem Zuchtstand nur einige Fehlfarben vorkommen, geben wir sie doch erst im Vorfrühling nach Farbsortierung ab. Im	en.
Herbst nur auf eigenes Risiko	—,60 —,50
denticulata, Ballprimel, zart violettblau, 25 cm, April	-,50
— alba, reinweiße Blüte	-,60
- atroviolacea, tief dunkelviolett	-,60

elatior graff. aurea, goldgelbe, großblumige Doldenprimel	-,50
— rote Farben	-,40
juliae, weinrote Teppichprimel, verträgt sonnigere Lage	-,50
helenae Oberschlesien, das starke Purpurrot der nach elatior- Art in gestielten Dolden blühenden Sorten macht sie zu einem Wirker ersten Ranges. Wüchsig, und äußerst reichblühend,	
April-Mai	-,60
— Schneekissen, man kann sich im Frühjahr schwer etwas Reizvolleres denken als die Polster einer niedrigen Primel, die wie "Schneekissen" von goldgeäugten, schneeweißen Blüten überschüttet sind. April-Mai, 10 cm	—,70
— Wanda, purpurblaue Blütenfülle, starkwüchsig, 15 cm	-,50
rosea grdfl. Rosenprimel, die rubinrot-knospende Dolde sitzt fast auf der Erde, erhebt sich bis zu 15 cm, rosenrot erblühend. Diese Primel liebt humos-lehmigen Boden, und eher feuchten, als nur frischbleibenden Standort, dann aber sonnig. April-Mai	
Sieboldii, japanische Waldprimel, karminrosa mit heller Mitte, Mai, 20 cm, Laub zieht früh ein!	—,70
3. Höhere Primeln, Juni-Juli ()	•
bullesiana, Etagenprimel, blüht in orange, rot oder lila und reichsten Abstufungen, Blütenschaft 40 cm	-,60
bulleyana, dieselbe Form in Terracottagelb, z. Zt. nicht lieferbar	-,-
florindae, große, gelbe Dolden, 50 cm hoch, duftend	-,60
japonica, weinrot, große Dolden, 40 cm, Etagenprimel, ab Ende Mai (Selbstausaat)	-,60
microdonta, edle, hellgelbe, etwas hängende Blüten in großer Dolde, duftend, 40 cm	-,60
pulverulenta, Etagenprimel, feines, bräunliches Rot, 50 cm	-,60
veitchii, chinesische Waldprimel, purpurfarben, Laub fein behaart, 25 cm, Juni	-,60
ulmonaria, Lungenkraut ()	
azurea, enzianblau blühende Schattenpfl., wertvoll, März-April saccharata Mrs. Moon, Blüten rosarot, Laub silberscheckig	
Pyrethrum, Bunte Frühlingsmarguerite (
Einfach blühende Sorten, Mai-Juni	00
roseum Eileen May Robinson, warmes Silberrosa	
— Hamlet, altrosa	
— James Kelway, tiefes samtiges Rot, blüht etwas später	-,80
amondia, Ramondie (Gesneriaceae) ()	
Diese eigentümlich schönen Pflanzen absonniger Felsen ge-	
hören zu den Schätzen feiner Anlagen. Ganz flache, dicht- und	
großblättrige Rosetten mit "Usambaraveilchen"-ähnlichen, rei-	
chen, kurzgestielten Blüten, zartlila, Juni-Juli, nordost- bis	
nordwestlich geneigte Plätze, zwischen Steinen, z. B. mit Selaginella, Asplenium, Hutchinsia, Cyclamen usw. Humus zu-	
geben, sonst aber leicht wachsend	

Nathaliae, Blumenkrone vierblättrig	
	1,20
Ranunculus, Hahnenfuß () aconitifolius flore pleno, dieser Hahnenfuß liebt frischbleibende Böden und lichten Schatten, er blüht mit dicht gefüllten, weißen "Knöpfchen" mit Akelei, Trollius usw., 40 cm, Mai-Juni.	1,00
Rodgersia, Schaublatt (▶ ≧ Mächtige, ornamentale Blattpflanzen mit schönen Blütenrispen; schattige und eher feuchte Lage, Juli	
aesculifolia, Laub kastanienblatt-ähnlich, 70 cm hoch, weißrosa tabularis, gewaltige Schildblätter, 70 cm hoch, Blütenschaft etwa	1,00
140 cm, kremeweiß	1,00
Rudbeckia, Sonnnenhut O	
laciniata Goldball, Blüten warmgolden, gefüllt, 180 cm, 7-8 nitida Herbstsonne, große, einfache, goldgelbe Blütenschirme,	-,50
fast 200 cm hoch, September	,50 ,60
— Abendstern, tief karminrot	1,00
speciosa newmannii, sehr wichtiger Träger satter, spätsommer- licher Farbe, bedeutsam gerade durch die geringe Höhe, zu einer Zeit, in der sonst die hohen Stauden stark dominieren. Goldsterne mit schwarzem Knopf, sehr lange blühend, von An- fang August bis Ende September. Mit blauen Aster amellus usw. Ca. 60 cm	
sullivanti Goldsturm, diese vor zwei Jahrzehnten neu entdeckte Art ist, obwohl voriger sehr ähnlich und mit demselben Grundklang schwarzgeäugter, goldener Sterne wirkend, doch von eigenem Charakter. Größere, eigentümlich rassige Blüten mit auffallend langgezogenen strahligen Blumenblättern. Durch die reiche, kandelaberartige Verzweigung der starken Mittelstiele bauen sich aus üppigem Grundlaub breite, massive Blütenpyramiden endloser Blühdauer und intensivster Goldwirkung auf, — während obige Art in ihrem ganzen Aufbau lichter und lockerer bleibt. Zwei vom Ausdruck her doch recht verschiedene Charaktere, beide von eigenem Wert. Die bei speciosa ausreichende Winterhärte hat hier Absolutheit. Ca. 80 cm	—,80
Sagina, Sternmoos O	
subulata, wintergrünes "Sonnenmoos" mit weißen Sternblüten, flachste Polster	,40
Salvia, Salbei O nemorosa superba, Staudensalbei, mit langen, tiefvioletten Blütenähren. Eine im Alter mächtige Staude. 100 cm, Juli-August, wertvoll	—,70
Sanguinaria, Blutwurzelanemone	
canadensis. Weiße, anemonenartige Sternblumen über schönen bläulichgrünen Blättern, die sich zur Blütezeit im Vorfrühling eben entwickeln und noch halb, wie ein Mantel, um die Stiele geschlagen sind. Zieht im Sommer ein. 20 bis 30 cm. Halb- schattig, humos, nicht zu trocken. Kalkarm! April. Etwas für Feinschmecker	1.50

Santolina, Heiligenkraut \bigcirc	
tomentosa, ein Zwergstrauch für sonnigste, trockene Lagen, der mit dem hellen Silbergrau seines ganz fein zerteilten Laubes wichtige farbliche Stimmungswerte in Steingärten oder heide- artige Pflanzungen hineinträgt. Prachtvoll würzig-aromati- scher Duft. Laub winterüberdauernd, ca. 60 cm hoch. Alte Pflanzen oft meterbreit, können dann mit Vorteil im Früh- jahr zurückgeschnitten werden	
Saponaria, Seifenkraut 🔾 🛆	
ocymoides, karminrosa, lockere, bis 50 cm breite Polster. Am schönsten in Mauern und an Hängen, 20 cm, Juni	—,50
Satureja, Bergminze ○ △ pygmea (lilacina) ein nur 20 cm hohes Büschchen, nie lästig durch Selbstaussaat, wie S. montana, wichtig im Steingarten, 8-9.	—,50
Saxifraga, Steinbrech O-O A	
1. Moosartiger Steinbrech, beschattete Lage	
 caespitosa, Blütenteppich zartrosa, 15 cm, Mai — Purpurmantel, tiefes Rosenrot, 15 cm, Mai — Rosenschaum, eigene Züchtung. Ihre großrosettigen, festen Polster sind nach hiesiger, jahrelanger Prüfung hart und ausdauernd, wie keine der anderen farbigen Sorten. Die anfangs stärker rosa Blüten hellen zwischen der tieferen Tönung der nachschiebenden Blumen zu weißrosa auf, wobei sich viele Tonstufen ergeben, und sind hochgestielt. Das alles zusammen bringt einen farblich spielenden, reizvoll "schaumigen" Eindruck, dessen Schönheit zart wildblumenhaft ist. Das Wesentliche liegt hier nicht in der Einzelpflanze oder -blume, sondern stellt sich erst in der größeren blühenden Insel her. Sehr lange blühend. Mai. 25 cm muscoides, Blüten weiß, Laub im Sommer grün, im Winter broncerot verfärbend, 5 cm trifurcata, dunkelgrüne, starke Polster, Blüten weiß, verträgt etwas sonnigere Lage, Mai 	—,50 —,60 —,40
2. Harte Silberrosetten	
aizoon minor, feste, dichtgedrängte Polsterteppiche aus kleinen silbriggrauen Rosetten, weißblühend, 6 bis 12 cm, Juni, etwas absonnig!	—,40 —,50
3. Starr-rosettige Polsterzwerge, März-April, ca. 5 cm hoch	
apiculata, bildet große, dichte Teppiche und gedeiht ohne Schwierigkeit in beschatteter Lage. Blüten hellgelb T arco-valleyi, kleinnadliges Polster, große rosa Blüten T burseriana sulphurea, eine hellgelbe blühende Form der bekann-	—,60 —,80
ten burseriana, die nicht nur schön ist, sondern sich hier gerade im Polster gut bewährt hat	—,80 —,60

irvingii, silbergrau, zwergig, große, rosa Blüten, März T	
ochroleuca, blaugrün, Blüten gelb	-,60
rubella, halbkugeliger Silberzwerg, Blüten rosa T	1,00
4. Waldsteinbrech	
cuneifolia, kleine dunkelgrüne lederige Rosetten, teppichbildend,	
Blüten weiß, Mai, gedeiht leicht	
umbrosa, das bekannte Porzellanblümchen, Rispen 30 cm	-,40
cortusoides Fortunei — Herbststeinbrech. Eine vom Blatt bis in die Blüte edle Halbschattenpflanze höchsten Ranges, mit der überraschenden Eigenschaft, ihre Blüten im Oktober zu bringen. Rötlich-broncegrünes, nierenförmiges Laub, Unterseite hellpurpurn, wie eine Rexbegonie. (20 cm.) Ihm entsteigen im Herbst, höchst aufregend, lackrote Knospenstiele, welche sich zu verzweigten, duftig-weißen Rispen entfalten! (ca. 35 cm).	
Das jeweils untere Blatt der fünfzähligen Blütchen ist auffallend verlängert und durchlängt die Rispen so, daß ein silbern- "spinnwebartiger" Eindruck entsteht, in herrlichem Zusam- menspiel mit den roten Stielen. — Bezaubernd zwischen Wald- gräsern, Epimedien usw., im ersten Herbstlaub. Humoser Bo- den. Lichtschattig, aber warme Lage, — also z. B. nicht Nord-, sondern innerer Südrand von Baumgruppen. Sonst gelegent-	1.00
lich gehemmtes Erblühen	1,20
Scabiosa, Staudenscabiose (
caucasica, Blüten hellila, langstielig, 50 cm, wertvolle Kleinstaude, Juli-August	,60
Scutellaria, Helmkraut () ()	
canescens, wichtiger Spätblüher, Wuchs straff aufrecht, pastell- blaue Blüten, schön nahe der Silberdistel, 50 bis 60 cm, Aug. z. Zt. nicht lieferbar	_,_
Sedum, Fetthenne O-O \triangle	
album, zierlich, broncegrün, weißblühend, Mai-Juni	-,40
— murale, tiefrotbraune Polster, Blüte rosaweiß, 10 cm	
anacampseros. Dieses silbergraue, walzenförmig ornamentale Sedum mit der rosa Blüte ist als Bodenpflanze sehr charakter-	-,50
voll. Verträgt auch Halbschatten	,,00
breitblättrigen Polstertypen, aber fast wintergrün! Von daher ein ganz besonderer Wert unter den Teppichbildnern des Sedumreiches, gelbblühend. Juni-Juli	-,40
middendorfianum, nach unserer Meinung eine der wesentlichsten	
Sedumarten überhaupt. Alles an der Pflanze ist rassig und schön: das sternförmig angeordnete, streng nadelartige Laubwerk der Polster, die in gedämpften bräunlichen Tönen liegen (zusammen mit silbernen Polstergarben, grauen Katzenpfötchen, Blauschwingel, Zwergjohanniskraut, Polsterglockenblumen, Erodium macrad. und so fort!) — das Sternmuster	
der flachen, goldgelben Blütenstickerei, die aus kupfrigroten Knospen aufbricht und tief broncerote Fruchtstände hinter- läßt, und schließlich (auf den meisten Böden in stark sonniger Lage) die dunkelrote Herbstfarbe des verglühenden Nadel- werkes. Ca. 15 cm. Juli	,50

nicaense, Poister aufsteigender "Fichtenastchen", Bluten gelb	-,40
selskianum hort. (-ellacombianum), selbst als großer Teppich niemals langweilig, Blüten gelb, frisch-hellgrünes Polster, Juli-August, 15 cm	-,40
sexangulare, Goldmoos-Sedum, 5 cm, Juni, Sonne T	
	-,40
sieboldii, niederliegende Triebe, blaugrüne, rundliche Blätter, rosa Blüten, Spätblüher, verlangt warme Lage, lockeren, gedüngten Boden, August-Oktober, Sonne	-,50
spathulifolium purpureum, silbergrau-purpurne, dickfleischige	
Blätter, goldgelbe Blüten, eher etwas humoser Boden, (auch lichter Schatten)	—,50
spectabile Brillant, große, karminrosa Blütenteller, dickfleischige, blaß-blaugrüne Blätter, August-September, 40 cm, Sonne.	,50
spurium pallidum, sehr guter Bodengrüner, welcher feine, aber geschlossene Decken auch im Schatten bildet. Blüte zart weiß- rosa, 15 cm, Juni-Juli	—,40
— roseum superbum, Teppichsedum, das Rosa der Blüte ist verträglicher als das Rot der andern Sorten	-,40
Selaginella, Bärlappgewächs () \triangle	
helvetica, flachster, hellgrüner Bodengrüner. Schönster Charakter wirklichen Waldmooses, reizender Teppich für Cyclamen, 3 bis 5 cm	-,60
Sempervivum, Felsenrose O A	
Aus dem überreichen, sich oft zu stark ähnelnden Sortiment führen wir eine Auswahl wirklich charakteristischer Arten	
arachnoideum, kleinrosettig, rötlich, silbern besponnen	-,40
affine, mittelgroß, hellviolettes Herz in grüner Rosette	-,50
calcareum, flimmernd graugrün-dunkelspitzig	-,50
fimbriatum, grünkugelig, rot gespitzt, rötlich bewimpert	-,40
hybr. Alpha, rotbraun — silbergrün	-,40
— Rubin, siehe Neuaufnahmen	-,60
Moggridgei, kleine, hellgrüne Rosetten, dicht besponnen	-,40
rubicundum, leuchtend rotbraun mit frischgrünen Rändern	-,40
großrosettig	
tectorum, grünblättrig	-,40
- pyrenaicum, sehr groß, mit goldbraunem Schimmer	-,50
- violaceum, grüne Rosetten, klar violetter Grund	
Senecio, Greisenhaupt → ○ ○ ○ ornamental großes Blattwerk und schöne Blüte, für Halbschatten und frischbleibende Böden, August-September	
clivorum, Dolden tief-goldgelber Sternblüten, 70 bis 120 cm	60
— Othello, echt! Blatt schwärzlich-grün, unterseits purpurn. Blü-	dell
ten orange, 70 bis 120 cm, z. Zt. nicht lieferbar	_,_
— rotlaubige Sämlingspflanzen von Othello	-,60
hybr. Hessei, hohe, goldgelbe Kerzen, Blattwerk 80 cm, Blüten 150 cm	—,80
Wilsonianus, schmale, 60 cm lange, gelbe Kerzen, 80/170 cm	-,80

Silene, Schaumnelke, Alpenleimkraut \bigcirc \triangle	
alpestris, zierliche, schneeweiße Blüten, lockerer Wuchs; mit Glockenblumen und Wildnelken, 10 cm, Juni-Juli	.—,50
Schafta, rosenrote Polster, 12 cm, Juli-August, wichtig als Spätblüher im Steingarten!!!	-,50
Sisyrinchium, Binsenlilie 🔘 🛆	
bermudianum (anceps) grasähnliche Laubbüschel, kleine, violett- blaue Blüten, Juni-August, 25 cm	-,50
Soldanella, Troddelblume, Alpenglöckchen ◑ △	
montana, gedeiht am leichtesten auf humos-saurem Boden (kalkfrei) im lichten Schatten, feingefranste, blauviolette Glöckchen, rundliche, wintergrüne Blättchen, März-April, 10 cm T	—,80
Solidago, Goldrute (
1. niedrige Arten	
brachystachia, Zwerggoldrute. 25 cm. Niedrige Büschchen, aus derem starren, filigranhaften Knospenwerk sich im August-September die Stickerei der recht großen Einzelblüten entfaltet. Ein äußerst wichtiger und reizvoller Spätsommer- bis Frühherbstblüher für Steingärten und feine Naturpflanzungen sonnigen Stiles, zwischen Polstern und Gräsern	— ,50
virgaurea nana, 50 cm hoher, sehr dichter, von kleinen Goldrispen gekrönter Busch. August	— ,50
	-,50
2. höhere Arten	
graminifolia, Bandgoldrute, — hörte sie nicht auf den Namen "Goldrute", der, wenn auch sehr zu Unrecht, für viele Menschen eine Art "Kollektivverurteilung" bedeutet, dann wäre sie in denselben Augen längst eine höchst begehrte Charakterpflanze von ungewöhnlichen Reizen.	
Schmale, etwas bogig wachsende Zweige, ganz durchsichtig mit feingeschnittenen, rel. kleinen Blättern besetzt, die in ihrer besonderen Eigenart geradezu an feinen Bambus erinnern. Anstelle der endständigen geschlossenen Rispen (wie bei den meisten anderen Goldruten), brechen hier kleine Blütenhäuf- chen aus allen Blattachseln. Oktober. — Die bläulichviolette	e de la companya de l
Bereifung des zähen Stieles, hier und da ein broncerot ver- färbendes Blatt, das locker gestreute Goldmuster, die Linien-	
kraft des Ganzen, das alles baut — ohne wirklich beschreibbar zu sein — an dem Eindruck einer Wildnisgestalt, wie sie uns der Herbst in solcher Rassigkeit wenige bereithält. Zwischen dem grünen Rutenwerk von Ginsterbüschen, rötender Berberis Thunbergi und lichthalmigen Gräsern, etwa Panicum virgatum	
(siehe dort) in bester wesenhafter Einordnung. Aber auch freistehend über niedrigen Gräsern usw. Vollsonnig! Eher etwas mager. Ca. 100 cm	-,70
hybr. Goldschleier, niedrige Sorte mit leichtgebauten Rispen, straffstehend, 1 m. August	—,50
- Schwefelgeisir, wichtige Frühsorte, die das schöne Goldrispen-	,00
motiv schon mit rotbraunem Helenium, dunkelviolettem Eisenhut usw. zusammen anklingen läßt. 1,30 m. Ab Anfang August	— ,50
shortii, die mächtige und straffe "Königsgoldraute" des Oktober,	- 50

Synthiris, Frunlingsschelle ()	
reniformis, violette Traubenähren, 15 cm hoch, Blätter rundlich-	
nierenförmig, 10 cm, für kleine Schattenwinkel, April, z. Zt.	
nicht lieferbar	-,-
Thaliature Wiggarante A	
Thalictrum, Wiesenraute ()-○ ≅	
aquilegifolium. Die lange nicht genug geschätzte heimische Am-	
stelraute der lichten, frischen Waldwiesenränder oder Wälder.	
Über dem herrlichen, akeleiähnlichen Laub stehen auf schlan-	
ken, aber festen Stielen die großen, fedrig-wolkigen Blüten-	
flausche. Hellviolett, gelegentlich weiß. Eine unserer schön-	
sten Stauden, zur Zeit von späterem Trollius, sibirischer Iris	
usw. Auch im Halbschatten mit Gräsern und Farnen. Duftig-	
ste Wirkung mit Fülle der Erscheinung und Kraft verbunden. 100 cm, Anfang Juni	00
	-,60
dipterocarpum, will zwischen höheren Stauden stehen, die sie mit	
ihrem weitverzweigten, lilavioletten Blütengeriesel graziös überragt. Lehmig-humoser Boden, auf Sand wintert sie aus.	
Zwischen Cimicifuga, niedrigen Sträuchern, Rhododendron	
u. a., dadurch in der Wurzel beschattet. Bis 200 cm hoch, 7-8.	-,80
	,00
tuberosum. Wir führen diese Art unseres Wissens erstmalig wieder in das Staudensortiment ein. Fein gefiedertes Laub, reiche,	
weiße Blüte im Juni. Im lichten Halbschatten ein Träger fein-	
ster Stimmung, ca. 60 cm	1,20
	1,20
Thymus, Thymian \bigcirc \triangle	
Dieser schöne Teppichbildner darf einzig nicht in die Nähe	
zwergiger Felsenpflanzen gebracht werden. Juni-Juli	
serpyllum albus, flachste, hellgrüne, weißblühende Teppiche	-,40
— coccineus, Laub mehr bräunlich, Blüte rötlichviolett	The second second
— major, Laub und Blüte etwas größer, später	
villosus, ganz flacher, grausilbriger Wollteppich	-,40
Tiarella, Waldschaumkerze ()-	
cordifolia. Bedeutsame wintergrüne Schatten-Bodenpflanze, de-	
ren dichte, flache Teppiche ab Spätherbst oder Frühwinter röt- lich-bronce verfärben. Im Mai kleine Wälder von zartweißen	
Blütenkerzen, 25 cm hoch. Leicht gedeihend und unverwüst-	
lich aushaltend	-,50
	,00
Trillium, Dreilapp-Lilie	
Auf kräftigem, lehmig-humosem Boden wird diese Waldlilie	
uralt. Sie überrascht in jedem Frühjahr immer wieder durch	
ihre seltsamen Dreiblattblüten, inmitten von drei ziemlich gro-	
ßen, dunkelgrünen Blättern. Höhe 30 cm, Mai	
erectum album, weiße nickende Blüten	1,00
sessile, aufrechte, tief-dunkelrote, sehr große Blüte	1,50
- Snow Queen, aufrechte, große, dreigeteilte Kelchblüten in	
zartem Weiß	1,50
The second secon	
Tritoma (Kniphofia) Fackellilie (
hybr. Bernocks Triumph, mächtiger Wuchs, mit leuchtend roten	
Kolben blühend. August-September. Das welke Laub erst im	
Frühjahr entfernen, trockene Deckung empfohlen, 60 cm	1,20
— The Rocket, hohe, starkrote Sorte	1,20

Trollius, Goldranunkel ○-① ≅	
hybr. Earliest of All, früheste, gelb, April-Mai, 50 cm	-,80
— Goldquelle, großblumig, weiches Goldgelb, 70 cm, Mai	-,80
Ledebourii, orangegoldene Schalen, geschmückt durch einen dich-	
ten Kranz gleichfarbiger, aufrechtstehender Staubbeutel, 80 cm, blüht erst gegen Ende Juni	—,80
Tulipa, Wildtulpe ○ △	
dasystemon. Die Blumenblätter dieser niedrigsten Wildtulpe sind	
weiß mit großem, goldenem Grund. Im Gegensatz zu anderen Tulpenarten (wenige Ausnahmen) handelt es sich hier um eine in der Sonne schalenartig, schön ausgebreitete Sternform von großem Reiz. Diese Art ist erfreulicherweise sehr leicht zu hal- ten, sogar Selbstaussaat! April, nur 10 cm hoch	-,40
Im Spät-Herbst oder Frühjahr 3 Zwiebeln im Topf	1,30
Tunica, Felsennelke () /	
saxifraga. Im Steingarten ein unentbehrlicher Spätblüher. Über	
grasartigem Grundpolster lichtes, zierliches Stengelwerk mit einem Schleier kleiner zartrosa Blüten von Juni bis August, 25 cm	40
The second of the companion of the second of	-,10
Veratrum ()-() nigrum. Der schwarzrote Germer, der so lange zur Anzucht be-	
nötigt, ist mit seinem breiten, goldenzian-ähnlichen Blatt und	
den hohen dunkelroten Blütenständen eine der eindruckvoll-	
sten Wildstauden überhaupt und, zumal als Seltenheit, keiner	
Empfehlung bedürftig. 150 cm. Ab Anfang August. Im Halbschatten mit Gräsern, Farnen, Eisenhut usw	2,00
Verbascum, Königskerze ○○	
densiflorum, Laub grün, Blüten goldgelb, bis 160 cm, Juni-Juli	- 60
hybr. Pink Domino, siehe Neuaufnahmen	THE PARTY NAMED IN
pannosum, die schöne Königskerze mit den großen, weißfilzigen	
Blättern, Blüten gelb, 150 cm	-,60
Veronica, Ehrenpreis ○ △	
1. Niedrige Arten	
armena, niedrige, gedämpftgrüne Polster von ganz feinnadligem Laub, schon im Vorfrühling überschüttet mit kurzen, leuch- tendblauen Blütentrauben, — einmalig schön zusammen mit der hellgelben Potentilla cinerea und ihren silbergrauen Tep- pichen. Trocken und sonnig. April. Wintergrün	— ,60
prostrata pallida, porzellanblaue Ähren, 15 cm, Mai	
rupestris, später, leuchtend blau, 12 cm, Mai-Juni	-,50
2. Höhere Arten	
Hendersonii, Japanischer Ehrenpreis, aufrechte Büsche, 60 cm,	
lange, tiefblaue Ähren, spät! August-September	1,00
incana, silbergraue Blätter, dunkelblaue Ähren, 40 cm hoch, Juni	-,50
spicata Romiley Purple, dunkel violettblaue Ähren, 50 cm hoch, Juli-August	-,60
teucrium Shirley Blue, enzianblaue Ähren, Juni, 30 cm	-,60

1. Hornveilchen, nur sonnig!	
cornuta Altona, kremegelb, 15 cm, üppigste Blüte ab Ende April bis ca. Mitte Juni auf festen Polstern	-,50
- Hansa, leuchtend dunkelblau, 15 cm, Blüte wie oben	,50
— G. F. Wermig, hellila, 20 cm. Wir haben bewußt diese alte Sorte wieder aufgenommen, weil sie allein in ihrer zierlichen, lockeren Art den Wildreiz des Hornveilchens in den Garten trägt, blüht noch länger in den Sommer hinein	— ,50
gracilis Lord Nelson, das Hornveilchen griechischer Herkunft ist in dieser Sorte sehr schön, von tiefem, samtigem Violett der großen Blüte mit kleinem gelbem Auge. Sehr früh blühend, oft schon ab Ende März	,50
2. echte, duftende "Veilchen", Halbschatten	
odorata Königin Charlotte, das bekannte, violette, wohlriechende Märzveilchen der Gebüsche usw. Die Sorte Charlotte bringt noch einen Nachflor im Herbst	,40
— Triumph , besonders großblumig und langgestielt, tiefe Farbe und guter Duft. April	—,50
Waldsteinia Waldsteinie	
sibirica. Ausgezeichneter Bodenbedecker des Schattens, der flache, dichte, wintergrüne Teppiche webt. Sogar in trockenen Böden, einmal eingewurzelt, jahrzehntelang haltbar, ohne im mindesten lückig zu werden. Blüte goldgelb, Mai, 10 cm	— ,50
Yucca, Palmlilie ()	
filamentosa elegantissima, breitlanzettliche Blätter, 100 cm hoher Blütenschaft, große, weiße Blütenglocken, Juli-August 1,50 –	- 2,50
Freilandfarne	
(verlangen zumeist schattige Lage)	
Adiantum, Haarfarn pedatum, zarte, hellgrüne Blattwedel auf feinen schwarzbraunen Stielen	2,00
Asplenium, Milzfarn	
trichomanes, kleiner reizender Mauerfarn	-,70
Blechnum, Rippenfarn penna marina, als ausgesprochener Teppichfarn, noch dazu wintergrün, eine viel zu wenig bekannte Erscheinung. Durch kriechende Kurzausläufer bildet er ganze Decken dicht nebeneinanderstehender, kleiner fester Wedel. In solchem wintergrünen Farnteppich liegen natürlich sehr besondere Stimmungswerte beschlossen, deren man sich für bestimmte Auf-	
gaben mit mehr Phantasie bedienen sollte, 10—15 cm T	—,80
spicant, sehr schmale, wintergrüne Wedel, 30 cm, lockere, frischbleibende Waldböden	—,70

officinarum. Der kleine "Schriftfarn" liebt im Gegensatz zu anderen Farnen doch wärmere Lagen, für Mäuerchen usw. Immergrüne kleine Wedel mit silbrig-bräunlichen Schuppen. 10 bis	
15 cm. Sehr reizvoll	1,00
Matteucia, Straußfarn struthiopteris, 70 cm, schöne, regelmäßige Wedel in Becherform zusammengestellt	,60
Onoclea, Perlfarn	
sensibilis, die Wedel sind breitblättrig gefiedert, schmückende Fruchtblätter, gedeiht auch auf ziemlich feuchtem Standort, 50/60 cm	,80
Phyllitis, Hirschzunge	
scolopendrium, Wedel länglich-lanzettlich, ungeteilt, 40 cm — undulatum, die gewellt-blättrige Hirschzunge	
Polystichum, Punktfarn	
angulare proliferum, feingefiederter Mooswedelfarn, besonders wertvoll durch sein weichgedämpftes Wintergrün, 50 cm	,80
Winterharte Heidekräuter	
Erica, Schneeheide 🔾	
carnea alba, weiß, z. Zt. nicht lieferbar	
Wivelli, dunkelrot, späteste	-,80
Vertragen Rückschnitt, bevor sie verblüht sind, gedeihen leicht	
Winterharte Schmuckgräser	
Die Gräser und auch die Farne gehören mit den Blütenstauden zusammen zum Grundstoff der modernen Gartenkultur, welche außerhalb der eigentlichen Rabatten zu einer künstlerischen Gesamtatmosphäre des Pflanzenausdruckes hinstrebt	
X bezeichnet die Gräser, deren Ährenhalme vor der Reife zur Vermeidung von Selbstaussaat fortzuschneiden sind.	
ϕ bezeichnet die erreichbaren Durchmesser der einzelnen Art. Dort, wo die Blütenhalme den Grasschopf bedeutend übersteigen, geben wir die Blütenhöhe als zweite Zahl an	
1. Gräßer für vollsonnige Lage	
Avena, Blaustrahlhafer candida, ϕ 80 cm, 50/130 cm, Juni-Juli, nicht für strenge Lehmböden	,50
Carex, Segge	
montana, feinhalmige Bergsegge mit leicht überhängenden Schöpfen. Eines der besten feinen und niedrigen Gräser für sonnige Lagen und entsprechende Pflanzungscharaktere, z.B.	

mit Schneeheide, Aster amelius, Glockenblumen, Rosmarinseidelbast, Silberdistel, Katzenpfötchen usw. Von besonderem Reiz das allmähliche, bräunliche Aufglimmen der Schöpfe im Herbst, bis sie schließlich in gedämpften Fuchstönen stehen, über die noch der Schnee fällt. Aber auch die schwefelgelbe Pinselblüte aus morschem Vorfrühlingspolster, zur Zeit der Adonis- und Küchenschellenblüte, hat eine tiefe Eigenart. H 20 cm, ϕ 40 cm	,5 0
Festuca, Schwingel	
glauca, Blauschwingel, ϕ 30 cm, H, 25 cm, Juli/August	,50
glaucescens, großer Schwingel, der in Bläulichgrün die Aufgaben des kleinen Blauschwingels für größere Verhältnisse übernimmt, z. B. flächig mit eingesprengter Silberimmortelle, Lavendel, Santoline, halbhohen Goldruten, Astern usw., oder als Einzelschöpfe vorspringend in zugehörige Polsterpflanzungen. Herrlich sein im Herbst stiller getöntes Graugrün zum Rot gefärbter Berberis Thunbergii oder der Beerenzweige von Felsenmispeln. — Dies nur als ausschnitthafte Anregungen. H 35 cm, Ø 40 cm, ×	— ,50
经工作工程的 经保证股份的 医	-,50
Pennisetum, Lampenputzergras	1.00
compressum, australisches Lampenputzergras	1,00
Wunderschöner, weicher Halmschwung der mächtigen Schöpfe, ϕ 150 cm, H 100 cm, September/Oktober, wie vorige	1,00
Miscanthus, Eulalie	
giganteus, etwa bis 250 cm hoch; Gräsergestalt von tropischer Üppigkeit	1,00
"hybr. variegatus" (K. Foerster) Goldleisten-Miscanthus. Das hohe Aufsteigen und das Überfallen dieser Halmlinien gehört zu den schönsten Gräseranblicken, 70/150 cm	1,00
graeillimus, völlig verschieden von vorigen. Kein anderes Gras verbindet so die Kraft starker Büsche mit äußerster Zierlichkeit schmalster Blätter, die wie ein feines Gewebe von den tragenden Halmen abzweigen, graugrün flimmernd. Höhe bis	90
saccharifer, Silberfahnengras. Rohrähnliche Erscheinung. Silber-	-,80
weiße Blütenfahnen im Herbst über rötlichbraun verfärbendem Laub von schönstem Schnitt. Mannshoch, etwas wuchernd	—,80
Molinia, Pfeifengras	
altissima, Riesenpfeifengras. Überraschend, wie aus dem ca. 60 cm hohen, dichten Blätterbusch die Blütenstiele mannshoch, elegant, und von keinem Regensturm zu beugen, aufsteigen. Noch überraschender, wenn im Oktober alles in tiefem Herbstgold aufflammt. Unbenutzte Ausdruckskraft, wie bei vielen Gräsern	1,20
Panicum virgatum, siehe Neuaufnahmen	-,80
Stipa, Federgras	
pennata, ungarisches Federgras, ϕ 40 cm, H, 30/70 cm	-,50

2. Waldgräser, also halbschattig - schattig

Aira, Schmiele	
caespitosa, Waldschmiele, ϕ 70 cm, H 40/90 cm, \times	,50
Carex, Segge japonica, immergrüne, scharfblättrige, starre Horste, Ø 60 cm, H 40 cm	-,60
NOT A THE COMPLETE OF THE PROPERTY OF THE PROP	-,60
umbrosa. Die schmalen Halme dieser breit werdenden, tiefgrünen Kissen fallen strahlig und geordnet nach allen Seiten, als seien sie gekämmt. Durchaus grundlegendes feines Gras für Halbschatten-Pflanzungen m. Epimedien, Christrosen, Herbststeinbrech und vielem anderen. Auch schöner Grund für halbhohe Waldstauden. H 20 cm, ϕ 50 cm	—, 50
Festuca, Schwingel	
scoparia, Bärfellgras, moosgrün, bildet herrliche, weiche Rasen (keine Trampelrasen), es verträgt auch Sonne! H ca 25 cm . T	—,50
Luzula, Marbel	
silvatica, große Waldmarbel, wintergrün, ϕ 50 cm, H 40/70 cm	-,50
Zwerggehölze	
Betula, Zwergbirke ()	
nana, niedriger, lichter Busch mit kleinen rundlichen Blättern. Bis 1 m, auf etwas torfgemischtem Boden, mit Heidearten und ähnlichem	1,00
Cotoneaster, Felsenmispel, roter Beerenschmuck	
horizontalis, fächerartig sich ausbreitende Zweige T	1,00
humifusa, flach, bodenanliegend, wintergrün T	1,00
praecox, gedrungen buschig, früher Beerenschmuck T	1,00
Cytisus, Ginster (siehe auch Genista)	
decumbens, mit niederliegenden Zweigen wachsender Ginster von großem Reiz für Stein- und Wildgärten. Bildet allmählich dichte breite Zweigpolster, die im Mai gedrängt goldgelb blühen	1,00
praecox, der bekannte Elfenbeinginster, 150 cm, hellgelb, Mai, T	1,50
Evonymus, Spindelbaum	
kewensis, feinblättrige Teppichspindel, für lichten Schatten ein	
ausgezeichneter Bodengrüner, 15 cm, immergrün T	—,70
Genista, Ginster ○ △	
dalmatica, ein kleiner, nur 10 cm hoher Polsterginster aus Dalmatien, welcher im Juni von goldgelben Rispen überschüttet ist. Etwas dornig. Reizend für trocken-sonnige Steingarten-	and the
plätze	1,30

Hedera, Epheu)	
helix minima, kleiner, aufrechter Efeu-Busch	1,00
Hypericum, Johanniskraut ()	
patulum Henryi, etwa 1 m hoher lichter Strauch mit großen, gelben staubfäden-geschmückten Blüten vom Reiz des niedrigen Hypericum calycinum. August	—,80
Potentilla, Fingerstrauch (
Farreri, goldgelber Dauerblüher, wird ca. 100 cm hoch, Juni- Oktober	-,80
mandschurica, weiß blühend, gedrungener Wuchs, 60 cm, bis 100 cm breit, blüht ebenfalls von Juni bis Oktober	-,80

Stauden=Zusammenstellungen nach unserer Wahl

Die folgenden Sortimente sind als Erleichterung für Sie gedacht. Sie stellen sorgfältige und auf große Erfahrung gestützte Auswahlen für bestimmte Verwendungszwecke dar.

Alle enthaltenen Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert. Bitte die Nummer des gewünschten Sortimentes (bei Nr. 7 und 8 auch ob a oder b, bzw. c) und die benötigte Stückzahl angeben. Bei Bedarf können die Höchstzahlen (je nach Sortiment 100 oder 50 Stück) natürlich auch mehrfach genommen werden. Wo keine 10 Stück-Sortimente angegeben, stellen wir auf Wunsch auch diese zusammen.

I. Für Steingärten, Terrassenbeete und ähnliches

Grundlagensortimente

1. Schöne und bewährte Sorten	
100 Stück in 25—30 Sorten	45.00 DM
50 Stück in 15—20 Sorten	22.50 DM
25 Stück in 12—15 Sorten	11.80 DM
2. dasselbe unter Zugabe seltnerer und teurerer Sorten	
100 Stück in 25—30 Sorten	54.00 DM
50 Stück in 15—20 Sorten	27.00 DM
25 Stück in 12—15 Sorten	14.25 DM
Labreszeitliche Ausschnitte	
Jahreszeitliche Ausschnitte	
Jahreszeitliche Ausschnitte 3. der Früh- und Hochsommer	
3. der Früh- und Hochsommer	27.00 DM
3. der Früh- und Hochsommer 50 Stück in 15—20 Sorten	
3. der Früh- und Hochsommer 50 Stück in 15—20 Sorten	14.25 DM
3. der Früh- und Hochsommer 50 Stück in 15—20 Sorten	14.25 DM 27.00 DM

Sonstige Besonderheiten

	Sonstige Besondernetten		
5.	Feinwüchsige Arten für das kleine Steingärtchen		
	50 Stück in 20—25 Sorten	31.50 DM	
	25 Stück in 15—20 Sorten	16.60 DM	
	10 Stück in 8—10 Sorten	7.00 DM	
6	Kleinpflanzenfreude auch im absonnigen Steingarten		
0.		2000 775	
	50 Stück in 20—25 Sorten	10.00 DM	
	10 Stück in 8—10 Sorten	8 00 DM	
		0.00 1	
	II. Für besondere, natürliche Gartenpartien		
7.	Charakterpflanzungen an sonnig-trocknen Plätzen		
	a niedrige, bodenbedeckende Pflanzen		
	100 Stück in 20—25 Sorten	40.00 DM	
	50 Stück in 15—20 Sorten	20.00 DM	
	25 Stück in 10—15 Sorten	10.75 DM	
	b fuß- bis halbhohe Sorten, einzustreuen in die Grundfläc	he	
	50 Stück in 15—20 Sorten		
	25 Stück in 10—15 Sorten	14.25 DM	
	10 Stück in 8—10 Sorten	6.00 DM	
Q	Halbschatten, keine trübe Ecke mehr		
0.			
	a teppichbildende Arten und Kleinstauden		
	100 Stück in 25—30 Sorten	54.00 DM	
	50 Stück in 15—20 Sorten	14.95 DM	
		14.25 DW	
	b mittelhohe Pflanzen schönen Halbschattens		
	50 Stück in 15—20 Sorten	31.50 DM	
	25 Stück in 12—15 Sorten	16.60 DM	
	10 Stück in 8—10 Sorten	7.00 DM	
	c nur besonders edle und seltene, mittelhohe Arten		
	25 Stück in 12—15 Sorten	23 75 DM	
	10 Stück in 3—10 Sorten	10.00 DM	
	To bottom in the source of the	10.00 21.1	
	III. Für Rabatten, Beete und ähnliche Pflanzung	en	
	greifen hier speziell die halbhohen Stauden — also etwa		
	bis ca 1 m — heraus, da sie für die heutigen kleinen Gar		
	ondere Bedeutung haben und gerade in den speziell geeign	eten Sor-	
ten	oft noch sehr wenig bekannt sind.		
9.	halbhohe Rabattenstauden in guten Sorten		
	100 Stück in 20—25 Sorten	54.00 DM	
	50 Stück in 15—20 Sorten	27.00 DM	
	25 Stück in 10—15 Sorten	14.25 DM	
10. dasselbe einschließlich neuer und teurerer Sorten			
100 Stück in 20—25 Sorten 63.00 DM			
	50 Stück in 15—20 Sorten	31 50 DM	
	25 Stück in 10—15 Sorten	16.60 DM	
		-0.00 DI	

Verkaufs= und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Durch Erteilung eines Auftrages werden die Bedingungen als rechtlich bindend anerkannt.

Die Preise gelten in Deutscher Mark ab Verkaufsstelle ohne Skonto und Portoabzüge.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent, bei 50 Stück und mehr um 20 Prozent.

Beschwerden haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang zu erfolgen. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum berechneten Wert geleistet. Der Versand geschieht nur auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.

Durch ungünstige Witterung entstandener Ausfall an Pflanzen entbindet uns von der Lieferung, — trotz Bestätigung des Auftrages.

Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt; sie wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, weil dieses von zu vielen Voraussetzungen seitens des Pflanzenden abhängig ist. Die sorgfältige Anzucht unserer Pflanzen mit entsprechend guter Bewurzelung gibt jedoch dem Käufer die Grundlage zu bestem Erfolg.

Erfüllungsort ist Eutin, ausschließlicher Gerichtsstand in Sachen gegen mich Eutin, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Eutin oder der Geschäftssitz des Kunden.

Alle Aufträge, bei denen keine andere Verabredung getroffen ist, werden gegen Nachnahme ausgeführt.

Für jeden Schaden infolge mangelhafter Anschriftenangabe haftet der Besteller.

Neben der Postanstalt ist der Bahnhof für Fracht, Eilgut oder Express anzugeben. In Großstädten mit Vororten wichtig!

Postscheckkonto: Hamburg 343 19 Fernruf: Eutin 892



